This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

RY
CALIFORNIA.
XCHANGE

Untersuchungen

über die

Endigung der Nerven in den quergestreiften Muskeln der Arthropoden.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

hohen philosophischen Fakultät

der

Grossherzogl. Herzogl. Sächsischen Gesamtuniversität Jena

vorgelegt von

Dr. med. **Ernst Mangold**
aus Berlin.

Mit 8 Abbildungen im Text.

Jena,
Gustav Fischer.
1905.

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

OLOGY
IRARY
G

„Genehmigt von der philosophischen Fakultät der Universität Jena auf Antrag des Herrn Professor Dr. HAECKEL."

Jena, den 24. Februar 1905.

Professor D. Dr. EUCKEN,
d. Zt. Dekan.

Inhalt.

	Seite
Vorbemerkung	1
A. Historisches	1
B. Methode	10
I. Untersuchungsobjekte	10
II. Methylenblautechnik	10
1. Stärke der angewendeten Lösung	11
2. Färbungsverfahren	12
3. Beziehung der Färbung zur Funktion der Nervensubstanz	17
4. Fixierungsverfahren	20
III. Untersuchung	23
C. Resultate	24
I. Bau der marklosen Nerven der Arthropodenmuskeln	24
1. Achsencylinder und Fibrillen	24
2. Die Nervenscheide	27
II. Verlauf und Verzweigung der marklosen Muskelnerven	28
1. im Oeffnungsmuskel der Krebsschere	29
2. im Schließmuskel der Krebsschere	32
3. in den übrigen Skelettmuskeln von Astacus	33
4. in den Muskeln der Heuschrecken	34
5. in den Muskeln der Käfer	39
6. in den Muskeln der Schmetterlingsraupen	42
Anhang: Tracheennerven	44
III. Endigungsweise	46
1. Der Doyèresche Hügel und die Sarkolemmfrage	46
2. Nervöse Elemente im Innern der kontraktilen Substanz?	52
3. Beziehung der Nervenendfasern zur Muskelquerstreifung	55
4. Typus der eigentlichen Nervenendigung	56
IV. Die Varikositäten	57
V. Die Doppelinnervation	60
VI. Der Innervationsvorgang	62
D. Literaturverzeichnis	65

192222

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF
CALIFORNIA

Die Innervation der quergestreiften Skelettmuskeln der Arthropoden verdient aus mehreren Gründen ein besonderes Interesse; für den vergleichenden Anatomen, weil es sich um die höchstdifferenzierten kontraktilen Elemente handelt, für den vergleichenden Physiologen, weil wir hier ferner auch den flinksten aller Muskeln begegnen und zugleich eine eigenartige Doppelinnervation beobachten, welche vielleicht geeignet ist, für das Studium der allgemeinen Nerven- und Muskelphysiologie auf neue Gedanken zu leiten.

Ich möchte daher im folgenden über die Ergebnisse berichten, welche ich mit Hilfe der Methylenblaumethode an den Muskeln einiger Arthropoden erhielt. Dabei soll auch mitgeteilt werden, was sich mir neues bezüglich jener Methode von praktischer oder theoretischer Wichtigkeit ergab. Zuvörderst erscheint es jedoch notwendig, ja unumgänglich, die sehr verstreute und zusammenhangslose einschlägige Literatur einmal kritisch-historisch zusammenzufassen, um uns in den Status quo unserer Frage hineinversetzen zu können.

A. Historisches.

Naturgemäß kann es in dieser allein die Muskelnerven von Arthropoden behandelnden Arbeit nicht die Aufgabe sein, historisch darzustellen, wie sich unsere allgemeinen Kenntnisse von den histologisch-physiologischen Beziehungen zwischen Muskel und Nerv entwickelt haben. Hierüber finden sich ausführliche Literaturangaben

und geschichtliche Rückblicke bei KÜHNE [1]), ARNDT [2]) und MAYS [3]), bei J. GERLACH [4]) der noch besonders die älteren histologischen Methoden zusammenfaßt, und aus der Zeit der neueren Methoden bei RETZIUS [5]); SIHLER [6]) unterzieht die um die Jahrhundertwende noch strittigen Fragen dieses Gebietes einer eingehenden Prüfung.

Einen kurzen Ueberblick möchte ich dagegen hier einfügen über die bisherigen Methoden und Ergebnisse der Erforschung der Nerven und Nervenendigungen in den quergestreiften Muskeln der Arthropoden. Ich kann mich dabei um so kürzer fassen, als ich bei der Darstellung der eigenen Resultate mich stets auf die einschlägigen Literaturstellen beziehen werde.

Als erster hat bekanntlich DOYÈRE [7]) im Jahre 1840 eine direkte Verbindung zwischen Nerv und Muskelfaser beobachtet, und zwar bei Milnesium tardigradum. Er endeckte, daß jener Zustand der Erstarrung, des latenten Lebens, wie ihn die Tardigraden oder Bärtierchen mehrere Tage lang ohne Schaden aushalten können und wie er ihn durch 24-stündige Asphyxie in ausgekochtem und durch Oel abgeschlossenem Wasser herbeiführte, den Geweben dieser Tiere eine Lichtbrechung verleiht „qui les rend distincts du liquide dont ils sont baignés“ [8]). So konnte er die Nerven von den Ganglien her verfolgen und auf den Muskeln mit einer Verbreiterung endigen sehen, welche KÜHNE [9]) ihm zu Ehren den DOYÈREschen Hügel taufte. 1843 hatte QUATREFAGES [10]) DOYÈRES Befunde bestätigt, KÖLLIKER sie auch an einer Dipterenlarve erhoben.

Ueber die Nervenfaserelemente, „Nervenfibern“ und „Primitivröhren“ bei Krebsen, Spinnen, Insekten arbeiteten zuerst EHRENBERG [11]), NEWPORT [12]), HANNOVER, HELMHOLTZ [13]) in seiner Dissertation, REMAK, WILL [14]) und LEYDIG [15]), doch sämtlich, ohne die Nerven in ihre motorischen Endorgane zu verfolgen. Daß sie sich in ihrem peripheren Verlaufe wiederholt teilen, beschreibt zuerst HAECKEL [16]), und zwar

---

1) 1871 (Näheres siehe stets Lit.-Verz.), p. 147 und 165. — 2) 1873, p. 481. — 3) 1884. — 4) 1874, Das Verhältnis der Nerven etc., p. 1 und 18. — 5) 1892, p. 41. — 6) 1900, p. 323. — 7) 1840, p. 345. — 8) 1840, p. 332. — 9) 1871, p. 151. — 10) 1843, p. 300. — 11) 1836, p. 56. — 12) Siehe REICHERTS Bericht in MÜLLERS Arch. No. 1, 1843, p. CCI. — 13) Siehe auch REICHERTS Bericht p. CXCVII und SIEBOLDS Bericht ebenda p. II. — 14) 1844. — 15) 1855 und 1857. — 16) 1857, MÜLLERS Arch., p. 479.

ausführlich in der seiner histologischen Dissertation „De telis quibusdam Astaci fluviatilis“ folgenden Arbeit. Er beobachtete bereits die hier typische gleichzeitige Gabelung der meisten ein Nervenstämmchen zusammensetzenden Röhren [1]). Auch fand er es als erster naheliegend, „die einzelnen Fasern des Achsenbündels“ (Remaks zentrales Faserbündel) „für die wahren, letzten Formelemente der Nerven, die bisher als solche aufgefaßten Primitivröhren aber als gröbere Nervenscheiden, die ganze Komplexe von Primitivfibrillen umhüllen, anzusehen“ [2]). Er untersuchte teils in Krebsblut, teils in Seewasser, verdünnter Chromsäure oder Zuckerwasser und fand bei diesen Methoden, daß die Nervenzweige peripherwärts durch fortgesetzte Teilungen so fein, „blaß und undeutlich werden, daß man sie schließlich unmöglich mehr von echten Bindegewebselementen unterscheiden kann“ [3]).

Erst Kühne [4]) fand, durch Brückes Arbeit über das Verhalten der Muskeln im polarisierten Lichte auf die Käfermuskeln hingeleitet, in den tracheenarmen Beinmuskeln von Hydrophilus piceus und Oryctes nasicornis ein geeignetes Objekt für die Erkennung des motorischen Nervenendapparates, den er frisch im eigenen Blute der Tiere untersuchte. Er sah den Achsencylinder unter dem Sarkolemm stumpf endigen bezw. in die intramuskulären „Körnerreihen“ übergehen [5]) und erwähnt bereits, daß eine motorische Nervenfaser durch mehrere sekundäre Aeste mit demselben Muskelprimitivbündel in Verbindung treten kann.

Die Kühneschen Ansichten über die „Endplatte“ fanden eine wesentliche Klärung durch Leydig [6]), welcher auch zur Lösung der Sarkolemmfrage und zur Fibrillentheorie wichtiges beitrug.

1864 erkannte Rouget [7]) durch Untersuchungen an Crustaceen (Cancer maenas, Astacus), Dipterenlarven (Chironomus, Corethra) und Coleopteren (Cervus, Ateuchus, Carabus), daß der Doyèresche Hügel nicht die wahre Endigung des Nerven darstellt, daß er vielmehr durch die mechanische Abziehung des Sarkolemms durch die Nervenfaser entstehen kann, und daß auch die zwischen Sarkolemm und Muskelfaser liegende „substance granuleuse est complétement étrangère aux

1) 1857, Müllers Arch., p. 480. — 2) Ebenda, p. 482. — 3) Ebenda p. 538. — 4) 1859, p. 571. — 5) 1859, p. 576, vergl. Abbildg. in Strickers Handb., p. 150. — 6) 1864. — 7) Compt. rend. LIX. p. 852. —

éléments nerveux.“ Als einzige nervöse Elemente betrachtet er die aus der Bifurkation der Nervenendfaser im Gipfel des Hügels resultierenden Fibrillen, die fast unmittelbar nach Erreichung des Muskelprimitivbündels endigen oder sich nach entgegengesetzter Richtung der Oberfläche der kontraktilen Fibrillen anlegen, ohne Platten, Kerne und körnige Substanz, überhaupt ohne besonderes Endorgan. Wenn KÜHNE [1]) also noch 1871 schreibt, daß nach ROUGET die breiartige Masse mitsamt den darin liegenden Kernen die eigentliche Endigung des Nerven sei, so trifft das wenigstens für die Arthropoden nicht zu. KÜHNE [2]) faßt die weiteren Ergebnisse bei allen drei Klassen der Arthropoden zusammen, daß jede Muskelfaser eine große Anzahl von Nervenenden erhält, daß die Nervenscheide mit dem Sarkolemm verschmilzt und daß alle Nervenhügel „eine Sohle von Muskelbildungsmaterial besitzen“.

Während KÜHNE die Präparate frisch mit Zusatz von $^1/_2$ Proz. NaCl untersuchte, wandte ARNDT [3]) auch $^1/_{10}$—$^1/_5$-proz. Salzsäure oder $^1/_2$-proz. Essigsäure an, ferner hob er die leicht zu Verwechselung Anlaß gebenden Trachealendigungen durch Natron- oder Kalilauge oder Oxalsäure hervor; die Muskelfasern färbte er mit Chlorgoldnatrium, so daß in Essigsäure die ungefärbten Nerven deutlich wurden. Trotzdem bringen uns seine an einem reichen Material von Fliegen, Raupen, Spinnen und Crustaceen ausgeführten Beobachtungen außer in der Beurteilung des DOYÈREschen Hügels nicht viel weiter: Der Achsencylinder soll sich in das Protoplasma eines großen Kernhaufens auflösen, der mit anderen oberflächlichen oder im Muskelinnern gelegenen Kernen in Verbindung steht; dadurch soll „der Kontakt zwischen Nerv und Muskel auf das innigste bewerkstelligt“ sein [4]). Außerdem findet er, daß die Nerven bei allen drei Klassen der Arthropoden „extramuskulär als umspinnende, zum Teil netzartig verflochtene Fasern“ oder „intramuskulär durch Auflösung in eine körnig-faserige . . . Masse“ „zu endigen scheinen“ [5]). Weiterhin waren eine Aeußerung ENGELMANNS, welchem an den Nervenhügeln verschiedener Käfer mehrmals „die besonders innige Verbindung der Zwischenscheibe mit der Sohlensubstanz“ aufgefallen war: „Sollte hierin ein Fingerzeig für das Bestehen einer besonders innigen Beziehung der Nerven zur Zwischenscheibe gelegen sein?“ [6]), wie seine fernere Vermutung, daß „in physiologischer Beziehung . . . die isotrope

1) STRICKERS Handb., p. 157. — 2) Ebenda, p. 152. — 3) 1873, p. 481. — 4) 1873, p. 516. — 5) Ebenda, p. 520. — 6) 1873, p. 47.

Grundsubstanz der Muskeln ... als eine, wenn auch modifizierte Fortsetzung des Achsencylinders der motorischen Nervenfaser" würde betrachtet werden dürfen[1]), für FOETTINGER Grund genug, mehrfach abzubilden, wie sich die Fibrillen des Achsencylinders in die Zwischenscheiben fortsetzen. Er hat diese von dem Wunsche als Vater der Beobachtung erzeugten Resultate an Hydrophilus und anderen Käfern, an Periplaneta und an Raupen erhalten nach Fixation in starkem Alkohol oder Injektion von 1-proz. Osmiumsäure. Seine Ergebnisse bestätigt THANHOFFER in Wort und Bild an Hydrophilus, er hebt zugleich hervor[2]), daß KOLOMAN BALOGH schon 1865 ähnliches fand, nämlich „daß die Sohle der Endplatte gezahnt ist, und die Zähne in die anisotrope Substanz hineinragen". THANHOFFER fand an Insektenmuskeln, die er mehrere Stunden lang von einem Magenfistelhunde verdauen ließ, daß das Sarkolemm aus einer äußeren hyalinen und einer inneren kernigen Membran besteht[3]), weiter nach Färbung durch Goldchlorid, Ueberosmiumsäure und Karmin, daß der Nerv nur die äußere Lamelle durchbohrt[4]), sich in der Endplatte netzförmig verästelt und nicht unmittelbar mit der Muskelsubstanz in Berührung steht[5]). Letzteres widerspricht also seiner Fig. 2 und seiner Bestätigung FOETTINGERS[6]). BREMER konnte an den Beinmuskeln von Hydrophilus mit der Goldsäuremethode von COHNHEIM-LÖWIT[7]) die Beobachtungen ENGELMANNS und FOETTINGERS nicht bestätigen[8]). Er bildet eine von ihm deutlich gesehene Endverzweigung ab, glaubt auch an Querschnitten gesehen zu haben, wie „ein Endzweig sich in die Zwischensubstanz fortsetzte, welche die COHNHEIMschen Felder begrenzt". Von Bedeutung ist seine weitere Mitteilung, daß es in den Muskeln des Hydrophilus nur marklose, von einfachen Scheiden umgebene Nerven gibt.

Mit Anwendung der Goldchloridfärbung fand ROSSI, daß die Nerven der Trommelfellmuskeln der Singzikade (Cicada plebeja) sich wiederholt teilen und in sehr zahlreiche Endigungen auslaufen, die, ähnlich wie bei KÜHNE und ARNDT, von Kernen oder kerniger Substanz umgeben werden.

Sein Chef CIACCIO sah in den Flügelmuskeln von Chloë diptera den Achsencylinder in der körnigen Substanz eines DOYÈREschen Hügels sich verzweigen, bei Sphinx convolvuli teilte sich der Nerv

---

1) 1875, ebenda XI, p. 463. — 2) 1882, p. 29. — 3) 1882, p. 28. — 4) Ebenda p. 34. — 5) Ebenda p. 32. — 6) Ebenda p. 31. — 7) 1882, p. 196. — 8) Ebenda p. 179.

schon vor dem Erreichen des Muskelprimitivbündels in zwei Aestchen.

Gegenüber all diesen tastenden und widerspruchsvollen Versuchen, welche stets in unüberwindlichen technischen Schwierigkeiten ihre Schranke fanden, bedeutete auch auf dem Gebiete der Arthropodennerven die Einführung der vitalen Methylenblaufärbung durch EHRLICH die Bahnung eines freien, vielversprechenden Weges. Höchst merkwürdig muß es erscheinen, daß dieser seitdem noch nicht öfter begangen wurde. EHRLICH sagt bereits in seiner ersten Mitteilung im Januar 1886: „Auch beim Krebs erzielt man leicht Färbungen sensibler und motorischer Nerven. Die quergestreiften Muskelfasern lassen hier zwei Unterarten erkennen, die auch sonst morphologisch in betreff ihrer sonstigen Eigenschaften unterschieden sind. Die eine Art, die schmale, fein gestreifte Fasern enthält, entspricht in ihren Innervationsverhältnissen vollkommen dem Typus der glatten Muskelfasern, indem die Nerven sich intensiv färben und intramuskuläre Plexus bilden. Die zweite Art breiterer und grob quergestreifter entspricht vollkommen den quergestreiften Muskelfasern der höheren Tiere, indem die Nerven isoliert verlaufen, Oberflächenendverzweigungen bilden, welche durch Methylenblau nur ganz ausnahmsweise gefärbt werden“ [1]).

Der erste, der sich die neue Methode für unser Gebiet nutzbar machte, war BIEDERMANN. Als die physiologische Untersuchung der Innervation der Scherenmuskeln des Krebses ihm gezeigt hatte, daß „die Reizung des Scherennerven bei gleicher Stromstärke zu gerade entgegengesetzten Erfolgen an beiden antagonistisch wirkenden Muskeln führt, und zwar bei geringer Intensität der benützten Ströme zur Kontraktion des Oeffners und Erschlaffung des Schließers, bei starker Reizung dagegen gerade umgekehrt zu Kontraktionen des Schließers und Erschlaffung des Oeffners“ [2]), suchte er dieser auffallenden Erscheinung auch von morphologischer Seite auf den Grund zu gehen [3]). Während es BIEDERMANN mit der Goldmethode leicht gelang, die Nervenfasern bis in ihre feineren Verzweigungen zu verfolgen, versagte auch ihm diese Methode zur Darstellung der Endigungen. Die Methylenblaumethode führte hier leicht zum Ziel. BIEDERMANN fand am Oeffnungsmuskel ausnahmslos je zwei Achsen-

1) 1886, Deutsche med. Wochenschrift, p. 51.
2) 1887, Sitzungsber. der Kais. Ak. d. Wiss. XCV, III, Jänner, p. 35.
3) 1887, Sitzungsber. der Kais. Ak. d. Wiss. XCVI, III, Juni.

cylinder in einer gemeinsamen „Nervenscheide“ verlaufen und sich nach dem von HAECKEL beobachteten Modus stets gleichzeitig dichotomisch teilen[1]). Beide, meist verschieden dicke Achsencylinder endeten immer in derselben Muskelfaser in gleicher Weise[2]). Aehnlich war der Befund an allen übrigen Krebsmuskeln, wie auch bei Hydrophilus piceus. Jetzt endlich war auch über die Nervenendigung einiges Licht verbreitet, und BIEDERMANN konnte, wie bereits 1876[3]) den GERLACHschen Lehren von der „Sprenkelung“ und den „intravaginalen Nervennetzen“ der Muskelfasern, jetzt auch den FOETTINGERschen Angaben wirksam entgegentreten. Da die weitere Verfolgung jener Beobachtungen den eigentlichen Gegenstand der vorliegenden Arbeit bildet, werden wir auf die höchst interessanten Resultate noch des öfteren zurückzukommen haben.

Gute Beobachtungen an den Muskelnerven einer Feldheuschrecke, Oedipoda fasciata, machte MAZZONI[4]) mit einer modifizierten Gold-Ameisensäuremethode. Auch er sah in einer kernhaltigen Scheide oftmals zwei Achsencylinder verlaufen und bildet die doppelte dichotomische Verzweigung gut ab; doch scheint er diesem Befunde kein besonderes Interesse beizulegen. Die freien Nervenendchen legen sich oberflächlich der kontraktilen Substanz an und haben mit dieser nur „un semplice rapporto di contiguità“.

Zu ganz anderen Resultaten als CIACCIO gelangte RAMÓN Y CAJAL an den Flügelmuskeln der Insekten; an den leicht in Primitivbündel „dissociablen“ Muskeln von Hydrophilus, Musca, Vespa, Calliphora färbten sich mit der rapiden GOLGI-Methode mit ausnahmsloser Sicherheit die Tracheen, weniger zuverlässig auch die „cellules nerveuses“. CAJAL fand nämlich[5]) keine DOYÈREschen Hügel, wohl aber einen „plexus nerveux ou ganglionnaire“, der auf der Oberfläche der Hülle des Muskelbündels dieses der ganzen Länge nach umgab, mit multipolaren Nervenzellen, Anastomosen und freien, das Sarkolemm durchbohrenden Endfasern.

Die Methylenblaumethode führte nun BIEDERMANN[6]) und RETZIUS[7])[8]) zu weiteren schönen Erfolgen bei Wirbellosen, besonders auch bei Crustaceen. Hier untersuchte RETZIUS auch den

1) Sitzungsber. der Kais. Akad. d. Wiss. XCVI, III, Juni, p. 4.
2) Ebenda p. 8. — 3) 1876, Sitzungsber. der Kais. Ak. d. Wiss. LXXIV, III, Juli. — 4) 1888. — 5) 1890, p. 36.
6) 1891, Jenaische Zeitschr. f. Naturw. XXV, N. F. XVIII, p. 429.
7) 1890, Biolog. Unters. (Crustaceen).
8) 1891, Biolog. Unters. (Würmer etc.).

peripheren Verlauf der markhaltigen und marklosen Nerven. Er konnte die HAECKELschen Befunde bestätigen und erweitern. Zwischen den prachtvoll klaren Abbildungen finden sich auch mehrere von Muskelnervendigungen, varikösen, perschnurartigen Endverzweigungen ohne Endhügel (Taf. XIII, Fig. 9—11). Während die Achsencylinder der Muskelnerven bei Astacus keine Myelinscheide haben, fand er sie bei Palaemon markhaltig mit RANVIERschen Einschnürungen und Kernen. Auf Taf. XIII (1890) ist in Fig. 1 ein solcher abdominaler Körpermuskelnerv abgebildet, an welchem auch die doppelte, gleichzeitige dichotomische Teilung auffällt. Obgleich RETZIUS in Taf. VII, Fig. 4, in VIII 1 und 3, XI 2, 1a, XIII 12 ähnliche Teilungen zeichnet, äußert er sich zu BIEDERMANNS Ergebnissen an den Krebsmuskeln nicht weiter[1]). Auch 1892 bildet RETZIUS einige Muskelendigungen von Astacus und Palaemon ab[2]).

Angeregt durch die letzterwähnten Arbeiten gelangte RINA MONTI mit Hilfe der Methylenblaumethode als erste zu etwas genauerer Kenntnis der Insektennerven. Bei Orthopteren (Locusta viridissima, Bacillus Rossi, Gryllus campestris) zeigte sich der Achsencylinder von einer homogenen Scheide umgeben, mit deren Rändern er manchmal parallel lief; in anderen Fällen war er wellenförmig gekrümmt innerhalb der Scheide. Oefters liefen zwei Achsencylinder in einer Scheide, „l'uno, il principale, molto grosso ed uniforme, l'altro molto sottile e varicoso“ [3]), also ganz wie HAECKEL und BIEDERMANN am Krebs und Hydrophilus entdeckten. Die in überaus reicher Anzahl vorhandenen Nerven fand Fräulein MONTI von Tracheen begleitet und an den Teilungsstellen mit Kernen versehen. Von den mit den Muskelfasern parallelen Zweigen verloren sich feine Fibrillen auf der Oberfläche der Muskelfaser, die sie gitterartig umgaben, um punktförmig oder mit einer kleinen Anschwellung frei zu endigen. Bei Larven von Lucanus und Melolontha wie beim ausgewachsenen Hydrophilus fanden sich motorische Endplatten (Hügel) von verschiedenster Struktur. Bei den Schmetterlingen zeigten die Larven DOYÈRESche Hügel, an Thoraxmuskeln nervöse Zellnetze, die Imagines ein kompliziertes Fibrillensystem mit knopfförmigen Endigungen. Bei Hymenopteren endlich ließen Cimbexlarven dicke, kernhaltige Endplatten erkennen, über welchen das Sarkolemm in die Nervenscheide überging. Leider sind diese ergebnisreichen Angaben nicht durch Abbildungen anschaulicher gemacht, woran wohl das damalige

1) 1890, p. 46. — 2) 1892, Taf. XIV Fig. 5—7. — 3) 1892, p. 4.

Fehlen einer geeigneten Methylenblau-Fixierungsmethode bei Wirbellosen Schuld trägt.

In den letzten 12 Jahren ist, soviel ich ermitteln kann, kein Arthropode zur Erforschung seiner Muskelnerven mit Methylenblau injiziert worden, die Nervmuskelfrage wurde fast ausschließlich an Wirbeltieren, aus alter Gewohnheit hauptsächlich am Frosch studiert, und so konnte sich unser Gebiet keiner wesentlichen Bereicherung erfreuen, obgleich schon 1871 KÜHNE die Insektenmuskeln als geeignete Objekte für das Studium der Innervation bezeichnete, und obgleich diese doch als die höchstdifferenzierten aller uns bekannten Muskeln sich der vergleichenden Forschung immer wieder in den Vordergrund des Interesses hätten drängen müssen. Die technischen Schwierigkeiten sind nicht unüberwindlich.

So findet sich indessen nur noch 1900 in der bereits erwähnten Arbeit von SIHLER, welcher mit seiner kombinierten Methode [1]) der Maceration in Essigsäure-Glycerin-Chloral, der Färbung mit Hämatoxylin und Entfärbung in Essigsäure-Glycerin am Frosch zu Resultaten gelangt, bei deren Beurteilung mir einige Skepsis geboten erscheint, die im Texte gar nicht erwähnte Abbildung einer mit derselben Methode dargestellten „Nervenendfaser" aus dem Sprungbein „der Heuschrecke". Man wird weder über die Natur der eigenartigen Faserzüge noch die der kernartigen Gebilde dieser Fig. 15 ins klare kommen. Bei seiner Theorie der „Kontaktstellen" [2]) kommt es dem Verfasser auf eigentliche Nervenendigungen nicht an.

Mit einer ähnlichen Hämatoxylinfärbung nach NEGRO konnte dann noch AGGAZZOTTI 1902 bei Hydrophilus und Melolontha, deren Muskeln er nach MAYS Vorgang mit dem Perkussionshammer zerteilte (!), die Befunde von CIACCIO und MONTI bestätigen, daß der Achsencylinder sich im DOYÈREschen Hügel verzweigt und die Nervenscheide in das Sarkolemm übergeht. Von der feinkörnigen Substanz ausgehende Nervenfibrillen verzweigten sich unregelmäßig auf der Oberfläche der Muskelprimitivbündel, um ohne sichtbare Beziehung zur Querstreifung meist knopfförmig zu endigen [3]). Endlich erwähnt noch M. WOLFF 1902 beiläufig [4]), daß er bei Locusta und Culicidenlarven mit Methylenblau schöne Färbungen erhielt.

---

1) p. 324. — 2) p. 328. — 3) p. 728. — 4) p. 164.

B. Methode.

Aus den voranstehenden historischen Angaben wird man leicht verstehen, warum ich gleich von vornherein mein Heil mit der Methylenblaumethode versuchte. Man möchte sagen, allein schon der ästhetische Genuß, den die Betrachtung eines der Prachtbände von RETZIUS' Biologischen Untersuchungen gewährt, könnte zur Anwendung dieser Methode veranlassen. Wenn ich dann, außer bei einigen unbefriedigenden GOLGI-Versuchen, während meiner ganzen Untersuchungen ausschließlich die Injektion von Methylenblau zur Nervenfärbung anwandte, so wird man diese Einseitigkeit begreiflich finden, wenn ich hervorhebe, daß es mir nach Einarbeitung in eine bestimmte Technik gelang, 3 Stunden nach der Injektion die äußerst elektiv und unzweideutig gefärbten Präparate von Hydrophilus, Heuschrecke oder Krebs dauerhaft fixiert und zwischen Objektträger und Deckgläschen in Kanadabalsam eingebettet zur weiteren genauen Untersuchung zurücklegen zu können. Da konnten all die anderen Methoden mit ihren vielfach doch recht unbestimmten Resultaten wenig verlocken, das teilweise immerhin schwer zu beschaffende Material an sie zu riskieren. Es kam eben hier auf die geeignetste Methode wie auf geeignete

I. Untersuchungsobjekte

an. Als solche erwiesen sich mir Astacus fluviatilis, von Coleopteren der schwarze Kolbenschwimmkäfer Hydrophilus piceus, der Gelbrand Dytiscus marginalis, von Orthopteren (Laubheuschrecken, Locustiden) der Warzenbeißer Decticus verrucivorus, von Lepidopteren besonders die Raupe des Weidenbohrers Cossus ligniperda. Bei etlichen anderen Insekten mißglückte die Färbung oder waren die Muskeln schlecht zu präparieren, ersteres war meistens beim Maikäfer Melolontha vulgaris der Fall, letzteres wegen der Zartheit der Muskeln bei kleineren Raupen, z. B. vom Tagpfauenauge Vanessa Io, dem großen Kohlweißling Pontia brassicae, wie ferner auch bei Iulus und Asellus, wegen der breiig-klebrigen Konsistenz der Muskeln bei den Schmetterlingen (Imago) und Hummeln.

Ueber die

II. Methylenblautechnik.

im allgemeinen liegt hier keine Veranlassung zu weiterer Erörterung vor. Es ist hinlänglich bekannt, daß diese histologische Methode

sich nicht nach Schema F anwenden läßt, sondern je nach Gegenstand und Zweck der Untersuchung modifiziert werden muß. Ueber all die während des allmählichen Ausbaues der EHRLICHschen Methode eingeführten Verbesserungen und Aenderungen der Färbung und Fixation, besonders durch DOGIEL, SMIRNOW, APÁTHY, BETHE, ARNSTEIN, haben wir ausführliche Darstellungen von M. WOLFF[1]) und DOGIEL[2]). Von der Technik bei Insekten beschreibt nur BIEDERMANN die für Hydrophilus genauer, für die Dekapoden belehren uns BIEDERMANN[3]) RETZIUS, BETHE[4]), OWSIANNIKOW[5]). Daß andererseits bei der Methylenblaumethode stets mehrere Wege zum Ziele führen, beweist zunächst

1. die Stärke der angewendeten Lösung.

Während BIEDERMANN mit nahezu gesättigten Lösungen arbeitet (Astacus, Hydrophilus), ARNSTEIN und seine Schüler eine 4—1-proz., OWSIANNKOW eine $^1/_2$—1-proz., RETZIUS eine 0,2-proz. (Astacus, Palaemon) anwendet, stimmt M. WOLFF[6]) APÁTHY zu, wenn dieser sagt, daß es „nicht nur überflüssig, sondern geradezu nachteilig" sei, „eine konzentriertere Lösung als 1:1000 zu benutzen". Ich stellte mir anfangs von Methylenblau rectificatum von Dr. GRÜBLER-Leipzig, welches mir Dr. M. WOLFF dedizierte, tiefdunkle, völlig undurchscheinende, also wohl nahezu gesättigte Lösungen her in $^1/_2$-proz. Kochsalzlösung (nicht chemisch rein) und verwendete sie unfiltriert teilweise mit sehr gutem Erfolg. Als mir dann einige Krebse und Gelbrandkäfer mißglückten, fertigte ich mir eine neue Lösung an. In einem mit Alkohol, destilliertem Wasser und 0,6-proz. Kochsalzlösung ausgespülten Glasgefäß stellte ich 400 ccm einer 0,5-proz. Lösung chemisch nicht ganz reinen Kochsalzes her. Davon wurden 200 ccm in eine nacheinander mit Salpetersäure, destilliertem Wasser, Alkohol, destilliertem Wasser und Kochsalzlösung gespülte[7]) Flasche filtriert und 2 g frisch von GRÜBLER bezogenes Methylenblau rectificat. dazu gegeben. Diese 1-proz. Lösung hat mich zu meinen besten Resultaten geführt. Die Flasche wurde durch einen mit Filtrierpapier umwickelten Glasstöpsel verschlossen und blieb auf dem Arbeitstische stehen, wo sie in den Sommermonaten stets die Mittagssonne bekam. Erneuert habe ich die Lösung nie, auch nie

1) 1902, p. 164. — 2) 1903, Encyklop. d. mikr. Techn. — 3) 1891. — 4) 1896, Anat. Anz. XII, p. 33. — 5) 1900. — 6) 1902, p. 175. — 7) Vergl. DOGIEL, Encyklop., p. 811.

den sehr geringen Niederschlag am Boden durch Erwärmen wieder gelöst[1]), und doch erwies sich das Präparat, am 1. Mai hergestellt, im Oktober noch völlig brauchbar.

Von den verschiedenen

2. Färbungsverfahren

wandte ich fast ausschließlich die Injektion am lebenden Tiere an. Ich entnahm von der beschriebenen Methylenblaulösung direkt mit der PRAVAZschen Spritze die erforderliche Menge, welche natürlich mit der Größe der Objekte variiert. Bei Hydrophilus kommt man zum Ziel mit 0,5 ccm, welche vor dem letzten Hinterleibsring kopfwärts seitlich in das Abdomen injiziert werden. Je schwächer, langsamer und stetiger der dabei angewendete Druck, desto gleichmäßiger verteilt sich der Farbstoff im Körper, desto besser wird der Eingriff von dem Tiere vertragen, und desto weniger wird die Kontrolle der Farbstoffmenge dadurch unmöglich, daß, wie bei starkem Drucke, gleich wieder etwas aus der Injektionsöffnung herausgespreßt wird. In derselben Weise kann man Dytiscus injizieren, bei welchem 0,3 ccm genügen. Ob die Verteilung des Farbstoffes im Körper gelungen ist, kann an der Färbung des den Kopf mit dem Prothorax verbindenden Gewebes wie derjenigen Muskeln, welche den durch den Druck etwas hervorgestülpten After umgeben, beobachtet werden. Auch zeigt sich im gelben Rande des Dytiscus ein grüner Schimmer. Gegebenen Falles wird die Injektion wiederholt. Die Tiere schwimmen nach der Injektion meist ziemlich lebhaft davon, ich habe sie manchmal noch tagelang gehalten; durch größere Quantitäten werden sie allerdings schnell matt. Bemerkenswert war mir, daß ich nie eine auch nur minimale Bläuung des Wassers durch Farbstoffabgabe der darin schwimmenden injizierten Tiere beobachten konnte. Umgekehrt habe ich auch stets vergeblich versucht, die Nerven der Wasserkäfer durch Einbringen der Tiere in eine Methylenblaulösung zu färben, was ich nach den Erfahrungen[2]) von APÁTHY, BETHE, RETZIUS und DOGIEL an Hirudo, Unio, Ctenophoren und Amphioxus und von WOLFF[3]) an Distomen für möglich

1) Vergl. DOGIEL, Encyklop., p. 811.
2) Ebenda p. 819.
3) 1902, p. 175.

hielt. Doch selbst nach mehreren Tagen fand sich keine Spur des Farbstoffes im Innern der Dytisken. Die gleiche Methode war R. MONTI[1]) bei Planarien mißlungen. Ebenso negative Resultate hat KOLMER[2]) mit Larven von Corethra bekommen, welche er „wochenlang in dünner bis konzentrierter Farblösung" leben ließ. Aus eigenen Beobachtungen an Corethralarven schien mir allerdings hervorzugehen, daß wenigstens die Chitinelemente der Haut im stande sind, sich von außen her mit Farbstoff zu imprägnieren. Die Pigmentierung des Chitinpanzers mit Methylenblau kann man übrigens, allerdings nur nach Injektion, bei helleren Exemplaren von Dytiscus deutlich sehen. Jene negativen Resultate scheinen mir beiläufig auch zu beweisen, daß die Wasserinsekten per os von der sie umgebenden Flüssigkeit selbst nichts aufnehmen. Mit der Nahrung aufgenommenes Methylenblau wird nämlich, wie man sich an Corethralarven, welche man mit gefärbtem Eiweiß füttert, überzeugen kann, von den Organen, z. B. Leber und Muskeln, aufgenommen. KOLMER sah sogar die Nervenstämme von Corethralarven sich färben nach Fütterung mit gefärbten Stentorkolonieen. Ich habe nur einmal mit einiger Sicherheit zwei Nervenstämme gebläut und verblassen sehen. Es war mir übrigens auch bei Unio pictorum nie gelungen, durch Aufenthalt der Tiere in einer Farblösung tiefere Nervenfärbung zu erhalten. Im Verlaufe mehrerer Tage färbte sich nur der Rand des Mantels und des öfters herausgestreckten Fußes.

Als mir einmal eine ganze Reihe von Gelbrändern und Maikäfern mißglückte, stellte ich mir die Frage, ob vielleicht bei dem außerordentlichen Tracheenreichtum auch der tiefsten Gewebe der Sauerstoffgehalt der Muskelnerven zu groß sei, um von ihnen das eingeführte Methylenblau zu seiner Leukobase reduzieren zu lassen. Ich suchte daher den Sauerstoffgehalt zu vermindern, indem ich eine Anzahl Exemplare von Dytiscus, Hydrophilus, Melolontha nach der Injektion im Exsiccator mit der Wasserstrahlluftpumpe bis zur Bewegungslosigkeit evakuierte, andere hielt ich nach der Injektion 3 bis 4 Stunden unter Quecksilber. Meine Erwartungen wurden nicht in dem gewünschten Maße erfüllt, da auch so einige Tiere keine brauchbare Nervenfärbung zeigten; bei den meisten jedoch erwiesen sich Verlauf und Endigungen der Nerven schön und ausgiebig gefärbt, und ich möchte darum diese wenn auch noch nicht entscheidenden Versuche nicht unerwähnt lassen.

---

1) 1896, p. 4. — 2) 1904, p. 222.

Bei Decticus (Locustidae) bekommt man schöne Nervenfärbung besonders in den intrathorakalen Muskeln durch Injektion von 0,15 bis 0,25 ccm der 1-proz. Methylenblaulösung kopfwärts seitlich ins Abdomen. Zur Präparation zieht man nach Abschneiden des Kopfes den Magen vom Schlunde aus hervor und biegt nach dorsalem Medianschnitte die Thoraxhälften auseinander. Bei der Injektion geht übrigens nie eine Spur des Farbstoffes in die Extremitäten hinein, wie das bei Astacus, Hydrophilus und Dytiscus stets der Fall ist. Man muß daher die Sprungbeine einzeln injizieren, um in ihren Muskeln Nervenfärbung zu bekommen. Hier kann wie bei der Injektion abgebrochener Krebsscheren nur das Gutdünken und eine gewisse Erfahrung die Menge der erforderlichen Lösung bestimmen. Das gleiche Gefühl wird bei der Behandlung der verschieden großen Raupen leiten. Der 2—3-jährigen Raupe des Weidenbohrers injizierte ich 0,1 ccm hinter das 3., 0,15 ccm in das 6. und 0,4 ccm vor das zweitletzte Segment. Mit diesen 0,65 ccm gelang die Färbung gleichmäßig schön in allen Teilen. Bei den Raupen muß man sich besonders hüten, zuviel zu geben, weil hier leicht durch Farbstoffüberschwemmung und Mitfärbung anderer Gewebselemente die Elektivität der Nervenfärbung leidet. Es empfiehlt sich hier übrigens auch, durch einen kleinen Einstich etwas Körperflüssigkeit heraustreten zu lassen und dann erst durch dieselbe Oeffnung zu injizieren, weil sonst durch die pralle Füllung des elastischen Hautmuskelschlauches die Injektionsflüssigkeit sofort wieder unter Druck ausgepreßt wird. Zur Präparation befestigt man die Raupen am besten in Bauchlage mit Nadeln auf einer Korkplatte, schneidet in der Rückenmittellinie längs auf und breitet die Tiere nach vorsichtiger Entfernung des Darmes und der blasig erweiterten Tracheen aus. So schont man am besten die von der Bauchganglienkette abgehenden Nervenstämme und ermöglicht auch der Luft den Zutritt.

Beim Krebs kann man auf mancherlei Weise eine schön elektive Färbung der Muskelnerven bekommen. Biedermann [1]) injiziert 0,5 bis 1 ccm einer nahezu gesättigen Lösung durch Einstich seitlich von der Medianlinie in den Thorax, Retzius [2]) 1—2 ccm einer 0,2-proz. Lösung ins Abdomen, Bethe [3]) bringt 5—6 Tropfen einer 1-proz. Lösung auf die venösen Ostien des Herzens und läßt auf diese Weise das Herz die Injektion besorgen, Owsiannikow injiziert unter die

1) 1887, Zur Kenntnis etc., p. 16. — 2) 1890, p. 25. — 3) 1896, Anat. Anz., p. 33.

Haut der unteren Fläche der Schwanzgegend. Ich injizierte mit gutem Erfolg anfangs seitlich der Medianlinie unter den hinteren Thoraxrand. Wenn mir die Farbstoffverteilung nicht gelungen schien, klappte ich ein Stück des Thorax auf, stach den nicht zu langspitzigen Spritzenansatz in das pulsierende Herz und ließ unter sehr leisem Druck etwas Farblösung in dasselbe eintreten. Es ist nun sehr schön zu beobachten, wie die blaue Farbe abwechselnd nach vorn und hinten in die Hauptgefäße geschleudert wird, und bei vorsichtigem, absatzweisem Nachfolgen der Lösung färben sich sämtliche Körperteile. Die große Vorsicht bei dieser natürlich auch ohne sonstige Injektion anwendbaren Methode ist deshalb geboten, weil das Herz schon bei geringem plötzlichen Ueberdruck leicht seinen Dienst versagt. Diesen beiden Methoden noch vorzuziehen und als sicherste am meisten zu empfehlen ist jedoch die Injektion von 0,6 bis 1 ccm der 1-proz. Lösung in die Bauchseite des ersten Abdominalsomits kopfwärts seitlich der Medianlinie, wobei es leicht gelingt, mit der Ansatzspitze subkutan zu bleiben, ohne sich in der Muskulatur zu verfangen. Vom Abdomen wie vom Thorax aus erfolgt sofort die Aufnahme des Farbstoffes in das Gefäßsystem. Man sieht das blaue Blut im einen Bauchgefäß pulsieren, auch die Scherengefäße wie die der anderen Beine schimmern dunkelblau durch. Dieses Verhalten macht jedoch sehr bald einer diffusen, entsprechend helleren Blaufärbung des ganzen Tieres Platz, welche ihrerseits wieder etwas verblaßt, wohl durch die nun einsetzende Reduktion des Farbstoffes zur Leukoverbindung. Wenn man dann das Tier nach einiger Zeit präpariert, zeigt sich die Körperflüssigkeit völlig farblos, auch die Muskeln nur noch in einem Hauch von blauem Farbenton, der besonders von der Färbung der Nervenstämme herrührt. Ist die Nervenfärbung mißlungen, so sind die Muskeln etwas stärker pigmentiert, der Farbstoff findet sich in feinsten Körnchen zwischen den Fasern.

Zur Färbung der Muskelnerven der Arthropoden kann ich die „direkte Methode“ durch Benetzung herausgeschnittener Präparate oder Einlegen derselben in eine Methylenblaulösung nicht empfehlen; wenigstens erhielt ich stets eine ungünstige Mitfärbung der bindegewebigen Elemente, konnte diese Methode daher auch als Ergänzungsfärbung nicht gebrauchen. Bei den Insekten verbietet sich übrigens jedes mehr als absolut notwendige Berühren und Umlegen der Präparate wegen der außerordentlichen Zartheit und Vergänglichkeit des Muskelgewebes von selbst.

Die Frage, wie spät nach der Injektion die zu untersuchenden Muskeln durch Präparation bloßzulegen und in der feuchten Kammer dem Sauerstoff der Luft auszusetzen sind, läßt sich anscheinend noch nicht einheitlich beantworten. Die Verteilung des Farbstoffes durch die Gefäße erfolgt momentan, sehr bald auch, wie beim Krebs zu beobachten ist, die diffuse Färbung und das Abblassen der Gewebe durch die Reduktion des Farbstoffes zur Leukoverbindung. Es ist schwer, sich vorzustellen, warum die Nerven zur Bindung des ihnen verwandten Pigments noch mehrere Stunden brauchen sollen. Und doch haben fast alle Forscher ihnen geraume Zeit dazu gegönnt. Owsiannikow geht sogar so weit, zu behaupten, daß man einen Krebs zum guten Gelingen der Färbung noch 12—14 Stunden nach der Injektion am Leben erhalten muß, und daß man keine Dauerpräparate bekommen kann, wenn das Tier schon nach 4—6 Stunden getötet wird [1]). Biedermann hielt die Krebse noch 2—4 Stunden in feuchtem Raum, die Hydrophilen 3—4 Stunden im Wasser. Auch ich habe die meisten Tiere erst nach Ablauf dieser Zeit oder wenigstens nach $1^1/_2$ Stunde getötet und präpariert, doch muß ich hervorheben, daß ich eine sehr vollkommene Nervenfärbung in allen Muskelgebieten auch erhielt, wenn ich bereits nach $^1/_4$ Stunde die Präparation begann. Ich kann daher das Amlebenerhalten der Tiere nach der Injektion zum mindesten nicht für dringendes Erfordernis halten. Mißglücken kann die Methylenblaufärbung leider noch oft genug so oder so; ihr eine ganz unfehlbare Sicherheit zu geben, ist mir ebensowenig gelungen wie all meinen Vorgängern in der Methode.

Aehnlich gehen die Erfahrungen auseinander über die Zeit, welche es dauert, bis die Färbung der Achsencylinder und ihrer Endigungen an der Luft hervortritt.

Retzius [2]) fand bei Garneelen nach 2—3 Stunden einige Nervenfasern gefärbt, nach 8 Stunden die Ganglienzellen teilweise, nach 12 bis 20 Stunden viele Ganglienzellen mit Fortsätzen; beim Krebs konnte er den Bauchstrang erst nach 18—24 Stunden untersuchen. Er folgert daraus, „daß es bei Wirbellosen viel länger dauert, ehe die Färbung der Nervenelemente entsteht und schön hervortritt“ [3]). Von den Wirbeltieren sagt Dogiel [4]): „Nach meinen Beobachtungen an ver-

1) 1900, p. 2. — 2) 1900, p. 25. — 3) 1900, p. 24. — 4) 1903, Encyklop., p. 813.

schiedenen Organen schwankt die für die Nervenfärbung erforderliche Zeitdauer, wie oben angegeben, zwischen 15—30 Minuten (für feine Häute, Schnitte u. dergl.) und 1—$1^1/_2$—2 Stunden (für dicke Präparate)." BIEDERMANN sah die Nervenfärbung beim Krebs nach einem Aufenthalt der Präparate in der feuchten Kammer von 2 bis 6 Stunden, bei Hydrophilus von 3—4 Stunden vollendet. Ich habe im allgemeinen beobachtet, daß die Nervenfärbung um so langsamer hervortritt, je später nach der Injektion die Tiere getötet und präpariert wurden. Da ich die Muskeln meist nach $1^1/_2$—$2^1/_2$ Stunden bloßlegte, so stimmt es mit BIEDERMANNS Resultaten überein, wenn ich die Nerven meist $1^1/_4$ bis $2^1/_2$ Stunden später gefärbt fand. Später als 3 Stunden nach der Präparation habe ich nie mehr eine Färbung auftreten oder zunehmen sehen. Wohl aber sah ich bei den Tieren (Astacus, Dytiscus), welche ich bereits einige Minuten nach der Injektion präparierte, die Nervenfärbung auch schon nach 1 Stunde vollendet und kaum mehr einer Zunahme fähig. Bei der Präparation zeigen sich fast stets die größeren Nervenstämmchen bereits blau, manchmal jedoch auch die feineren Verzweigungen und Endigungen schon so weit gefärbt, daß hier der Zutritt der Luft kaum noch etwas verbessern könnte. Besonders fiel mir das bei Raupen und Heuschrecken auf, und ich würde geneigt sein, dies eigenartige Verhalten mit der ausgiebigen Sauerstoffumspülung der Gewebe durch die Tracheen zu erklären, doch hat WOLFF [1]) eine ähnliche Erfahrung am Musc. cutaneus pectoris und mylohyoideus des Frosches gemacht. Es scheint demnach der Zutritt der Luft doch kein völlig unentbehrlicher Faktor zum Auftreten der Methylenblaufärbung der Nerven zu sein; doch möchte ich noch nicht so weit gehen wie OWSIANNIKOW, welcher die längere Berührung der Luft für die Färbung des Nervensystems als wirkungslos bezeichnet und behauptet, daß jedenfalls „die einzelnen Elemente dadurch nicht sichtbarer" werden [2]). Die verschiedene Schnelligkeit der Entstehung der Färbung scheint mir aufs neue darauf hinzuleiten, die Methylenblaureaktion in direkte

3. „Beziehung zur Funktion der Nervensubstanz"

zu bringen, wie es EHRLICH [3]) selbst bereits getan, welcher die verschiedene Färbbarkeit bei auch schon morphologisch unterschiedenen

1) 1902, p. 162. — 2) 1900, p. 2. — 3) 1886, Deutsche med. Wochenschr., p. 51.

Krebsmuskeln beobachtete. ARNSTEIN läßt die verschiedenen Resultate an Froschmuskeln ebenfalls vom jeweiligen Zustande der Nerven abhängen[3]). BIEDERMANN hat für die Muskeln der Krebsschere, von denen der Oeffnungsmuskel sehr leicht eine vollkommene Nervenfärbung zeigt, während sich die Nerven des Schließmuskels nur selten und auch dann noch unvollständig tingieren, selbst die physiologischen Unterschiede in der Innervation klargelegt. Weiter hat er die unvollständige, aber symmetrische Färbung der Elemente in den Ganglienzellen von Hirudo auf gleichartige funktionelle Zustände wie den Unterschied der Färbbarkeit auf chemische Differenzen bezogen[4]). Die schlechte Färbbarkeit der Nerven des Schließmuskels der Krebsschere gegenüber dem Verhalten beim Oeffnungsmuskel habe ich ebensowenig überwinden können. Weiter spricht für unsere Annahme aber noch, daß fast nie nur einer der beiden Scherenöffnungsmuskeln eines Individuums gute Färbung zeigt, sondern, wenn der eine, dann auch der andere mißlungen ist, ferner daß die Schnelligkeit des Auftretens der Färbung in zwei symmetrischen Muskeln stets nahezu gleich ist, während z. B. der Schließmuskel das Maximum seiner Tinktion meist schneller erreicht als der allerdings ausgiebiger gefärbte Oeffnungsmuskel. Weiterhin muß es höchst auffallend erscheinen, daß sich die zwei in gemeinsamer Nervenscheide verlaufenden Achsencylinder in den Muskeln des Krebses fast ausnahmslos beide tingieren, während in denen der Insekten, bei welchen wir ebenfalls zu einer derartigen Doppelinnervation kommen werden, meist nur einer. Ferner sah ich oft nur die größeren Stämme gefärbt, oft nur die feineren und die Endigungen. Es mag hier noch angeführt werden, daß diejenigen Tiere, welche nach der Injektion matt wurden oder es schon vorher waren, auffallend sicherere Färbungsresultate gaben als die munteren. Der Ernährungszustand scheint keinen ähnlichen Einfluß zu haben. Ich konnte zwischen der Färbbarkeit der Nerven von Hydrophilen, welche 14 Tage gehungert hatten, und solchen, welche sich an Froschkeulen gemästet hatten, keinen Unterschied beobachten.

Auch die längere Reizung mit Induktionsströmen vor oder nach der Injektion ergab beim Krebsscherennerv keinen merklichen Einfluß auf die Färbbarkeit.

Mit jenen günstigen Erfahrungen an den matt gewordenen Tieren stehe ich im Gegensatze zu WOLFF, welcher seine Wirbeltiere strychnisierte und fand, daß „diese tätigen und leicht erregbaren, nicht

1) 1887, p. 129. — 2) 1891, Jenaische Zeitschr., p. 436.

aber die ruhenden, schwer erregbaren oder gelähmten alkalisch reagierenden Nerven leicht und gut vital zu färben“ seien. Mein angeführtes Resultat läßt sich mit meinen Ergebnissen an den unter Quecksilber oder der Luftpumpe erstickten Käfern leicht in Einklang bringen, wie auch mit älteren Erfahrungen von ARNSTEIN und schon von EHRLICH, welcher außer der Sauerstoffsättigung die alkalische Reaktion als Bedingung für die Methylenblaufärbung bezeichnete [1]). EHRLICH kam weiter durch die Alizarinblaufärbung wieder anderer Nervenelemente zur Annahme von saueren, alkalischen und neutralen Fasern.

Die Frage nach dem Einfluß des funktionellen Zustandes der Nerven auf ihre Methylenblaufärbbarkeit steht in engem Zusammenhange mit derjenigen, ob diese Färbung eine vitale oder eine Absterbeerscheinung ist. Man hört immer noch gelegentlich die letztere Ansicht, obgleich schon mancher für den Vitalismus der Methylenblaufärbung eine Lanze gebrochen.

Daß das Methylenblau letal wirken kann, ist bekannt. Nach DOGIEL und ARNSTEIN [2]) gehen Säuger und Vögel nach einer größeren Infusion des Farbstoffes zu Grunde, ein Kaninchen stirbt während der Injektion der vierten PRAVAZschen Spritze in die Vena cruralis. Viele meiner Wasserkäfer und Krebse gerieten besonders nach Injektion ins Herz in einen Zustand, von welchem sie sich nicht wieder erholt hätten. Die Nervenfärbung kann in all diesen Fällen gelingen.

Daß die Färbung nach dem Tode noch eintreten kann, beweist die Injektion dekapitierter Tiere, die direkte Tinktion an herausgeschnittenen Teilen wie die DOGIELsche Erfahrung [3]) am Frosche, in dessen Extremitäten die Nervenfärbung noch 7—8 Tage nach der Trennung vom Körper sehr intensiv zu erreichen ist, wo andererseits ja bekanntlich die Lebenstätigkeit der Gewebe noch nicht erloschen zu sein braucht. Nach DOGIELS Anschauung verlieren die Nerven mit dem Absterben die Fähigkeit der Methylenblaubindung. Jedenfalls will er die angeführte Erfahrung nicht als Beweis dafür angesehen wissen, daß sich „auch längst abgestorbene Elemente noch färben“ können, wie KOLMER [4]) es mißzuverstehen scheint. DOGIEL glaubt vielmehr, daß „wir durch die Bestimmung, wie lange nach dem Tode des Tieres die Nervenelemente in den verschiedenen Geweben das Vermögen, durch Methylenblau tingiert zu werden, bewahren, die Möglichkeit erhalten, zugleich auch genau die Zeit zu bestimmen, wann erstere ihre Lebenstätigkeit verlieren — absterben“.

1) 1886, p. 52. — 2) 1887, Anatom. Anz., p. 553. — 3) 1890, p. 310. — 4) 1904, p. 221.

Von großer Bedeutung für die Entscheidung der Frage zu Gunsten der vitalen Auffassung ist die weitere Mitteilung DOGIELS, daß die verblaßte, ursprünglich durch Injektion erzielte Färbung wieder hervorgerufen werden kann, „indem man zu der Flüssigkeit, in welche das Präparat eingesenkt ist, etliche Tropfen einer $^1/_{15}$—$^1/_{16}$-proz. Methylenblaulösung hinzufügt“ [1]). Hierzu stimmt die Beobachtung KOLMERS, welcher von seinen mit gefärbten Stentoren gefütterten Corethralarven, welche diese Methylenblauapplikation sehr gut vertrugen, beschreibt, wie „im Verlauf von einer Stunde ... mehrmals deutlich zu sehen war, wie langsam im Ganglion die Färbung völlig verschwand, um einige Minuten später wieder aufzutreten. Merkwürdigerweise ließ sich öfters an verschiedenen Ganglien beobachten, wie die eine Hälfte des Ganglions sich dunkel färbte, während die andere Hälfte vollkommen farblos blieb“ [2]). Mir selbst ist es nicht gelungen, die KOLMERSchen Beobachtungen zu wiederholen, doch hege ich keine begründeten Zweifel an ihrer Richtigkeit.

Weiter möchte ich hier anführen, daß EHRLICH [3]) an lebenden Würmern, den „in der Froschblase schmarotzenden Eingeweidewürmchen“, „die bei Methylenblauinfusion des Frosches das blaue Serum in sich aufsaugen“, die Färbung der Ganglienzellen und ihrer Nervenfortsätze zu den Muskeln beobachtet hat. Ebenso sah RETZIUS [4]) in lebenden Appendicularien das ganze Nervensystem gefärbt, und WOLFF wies die Vitalität der Färbung an Froschmuskeln nach.

Diese Angaben lassen es mir als etwas gewaltsam vorkommen, wenn man die Aufnahme des Farbstoffes als Absterbeerscheinung erklären will. Sonst müßte die Färbung auch wohl immer gelingen, wenn man die Nerven zum Absterben bringt. Auch das Verblassen kann nicht stets durch das Absterben bedingt sein. Ich stimme nach obigem WOLFF nicht zu, wenn er DOGIEL entgegnet: „sobald die in ihrer chemischen Struktur äußerst labile lebende Substanz die Färbung annimmt, hört sie auf zu leben“ [5]). Daß die Methylenblaufärbung andererseits vielleicht trotz der Lebenstätigkeit eintreten und einstweilen nicht als Resultat derselben bewiesen werden kann, wird man APÁTHY mit WOLFF [6]) zugeben.

4. Fixierungsverfahren.

Bei der schnellen Vergänglichkeit der schönen Blaufärbung im frischen Präparate mußte es, besonders um zum genaueren Studium

1) 1890, p. 307. — 2) 1904, p. 223. — 3) 1886, p. 50. — 4) 1890, p. 2. — 5) 1902, p. 173. — 6) 1902, p. 172.

und zur Abbildung der feineren Verhältnisse zu gelangen, in hohem Maße darauf ankommen, eine geeignete Methode der Fixierung herauszufinden. Beim Krebs war das sehr einfach, da BIEDERMANN ein sehr zweckmäßiges Verfahren vorgeschlagen hat[1]) mit dem nach SMIRNOWS Vorversuchen mit Pikrokarmin von DOGIEL empfohlenen Ammonpikrat. Ich fixierte also ebenfalls die Krebsmuskelstückchen in der feuchten Kammer auf Filtrierpapierstreifen, welche ich mit einigen Tropfen einer gesättigten Ammonpikratlösung getränkt hatte. Dann kombinierte ich dieses Verfahren mit einer Nachfixierung in einer Lösung des von BETHE eingeführten Ammoniummolybdates, indem ich hierzu das BETHEsche Gemisch No. I benutzte. Bei den feinen, klebrigen, leicht verletzlichen Insektenmuskeln wäre ich mit dieser, mehrfaches Umlegen erfordernden Technik wohl kaum zu einem Resultate gekommen; ich ließ mich daher bereits bei meinen Krebsversuchen von dem Bestreben leiten, die Methode möglichst zu vereinfachen, und ließ zunächst die Vorfixierung in Ammonpikrat weg. Weiter verzichtete ich noch auf den Zusatz von Salzsäure, welche BETHE selbst als nicht absolut notwendig bezeichnet[2]) und ohne den auch DOGIEL ausgekommen ist[3]). Das ganze Rezept meiner Fixierungsflüssigkeit hieß demnach:

Ammon. molybdat.	2,0
Aq. dest.	20,0

Hiermit erzielte ich ausgezeichnete Fixierungsresultate bei Astacus wie bei Insekten, und zwar, wie DOGIEL, ohne besonders abzukühlen oder dergleichen. Auch an heißen Tagen gelang die Bildung des wasserunlöslichen Methylenblaumolybdates bei Zimmertemperaturen. Für die zierlichen Präparatstückchen genügte es stets, wenn ich ihren Aufenthalt in der Lösung, der Sicherheit halber, auf $^1/_2$ Stunde ausdehnte. Uebrigens dissoziieren sich die am Rande der Muskelstückchen gelegenen Muskelfasern stets in der Ammoniummolybdatlösung, wodurch sie oft ausgezeichnet isoliert werden. Im Gegensatze zu DOGIELS Erfahrung, daß selbst mehr als 24-stündiger Verbleib in der Lösung der Färbung nicht schadet[4]), fand ich die Nerven mehrfach nach 5 Stunden völlig verblaßt. Die Krebsnerven sah ich auch bei längerem Liegen auf Ammonpikrat wieder verbleichen. Ich möchte daher empfehlen, die Präparate lieber bald in Sicherheit zu bringen. Es folgt zunächst die Abspülung des Ammoniummolybdates in destilliertem Wasser,

---

1) Jenaische Zeitschr., 1891, p. 433. — 2) 1896, Anatom. Anz., p. 439. — 3) Encyklop., p. 825. — 4) Ebenda p. 826.

was man bei ganzen Krebsmuskeln auf eine kurze Wässerung ausdehnen kann; bei den zarten Muskelteilchen der Insekten muß man sich vorsehen, nichts durch den Wasserstrahl oder etwaiges Schütteln zu zerreißen, und es genügt hier auch ein langsames Umschwenken in zweimal erneutem destillierten Wasser. Danach läßt man die Stückchen mit Hilfe eines Spatels oder einer groben Pincette, welche nichts zerquetscht, die Reihe der 2—3 verschieden konzentrierten Alkohole passieren, und zwar möglichst schnell, weil der Alkohol im stande ist, die Färbung wieder zu vernichten. Etwas länger bleiben die Muskeln dann im Alkohol-Xylol 2:1 und im Xylol-Alkohol 2:1. Darin scheint die Bläuung nicht mehr so leicht zurückzugehen. Nach der Uebertragung in reines Xylol, in welchem die völlige Aufhellung der Muskelfasern erfolgt, kann der Aufenthalt darin natürlich beliebig ausgedehnt werden, bis das Präparat in Kanadabalsam zwischen Objektträger und Deckgläschen fertiggestellt werden soll. Die ganze Prozedur der Fixierung der gelungenen Nervenfärbung kann demnach zweckmäßig in $^3/_4$ Stunden nach der Entnahme der Muskelstückchen aus der feuchten Kammer bequem vollendet sein. Nun findet man oft bei der Durchsicht der auf einem Objektträger ausgebreiteten Präparate eine besonders gute oder in irgend einer Beziehung wertvolle Färbung an sehr kleinen Stückchen, deren Entfernung von dem Glase, auf welchem sie infolge minimaler, unvermeidlicher Verdunstung bereits etwas angetrocknet sind, auch bei größter Vorsicht nicht ohne mechanische Verletzung zu bewerkstelligen wäre, und deren mehrfache Umbettung mit Sicherheit die zarten Gewebe und damit den ganzen Wert der betreffenden Stellen vernichten würde. Solche Präparate müssen auf dem Objektträger in unveränderter Lage, und sonst völlig unberührt, fixiert werden. Das ist infolge des Festhaftens an der Glasfläche ziemlich einfach. Man benetzt sie mit einigen Tropfen der Ammoniummolybdatlösung und beobachtet, daß sie stets davon bedeckt sind. Nach kurzer Zeit spült man die Lösung weg, indem man auf der einen Seite des Präparates einen Filtrierpapierstreifen mit dem Rande der Flüssigkeit in Berührung bringt und von der anderen her einen leisen Strom destillierten Wassers leitet. Auf dem gleichen Wege folgen sich dann allmählich die Alkohole, Alkohol-Xylol und Xylol, wie bei der oben beschriebenen Methode, und durchströmen das Präparat, um auf der anderen Seite wieder abgesaugt zu werden. Dann kommen einige Tropfen Balsam und das Deckgläschen, und die Fixierung ist voll-

endet. Uebrigens hat sich auch schon DOGIEL der Fixierung auf dem Objektträger bedient, wenn er ein Präparat bereits auf demselben mit Methylenblaulösung gefärbt hatte [1]).

III. Untersuchung.

Auch über die Untersuchung sind bei den schwierigen Objekten, wie die Insektenmuskeln es sind, hier vielleicht einige Bemerkungen am Platze. Es ist klar, daß die über das Fortschreiten der Färbung orientierende Untersuchung möglichst rasch zu geschehen hat, damit an der Luft keine Vertrocknung eintritt. Wenn man die Objektträger mit den Präparaten alle Viertelstunden aus der feuchten Kammer nimmt und mit Zeiß 4 A durchsucht, wird man nichts versäumen. Es empfiehlt sich, bei den Insekten aus allen Muskelgruppen zunächst nur ganz wenige Stücke zu kontrollieren, die anderen möglichst lange mit den Chitinteilen in Zusammenhang zu lassen, da die Färbung in gleichartigen Muskeln gleichzeitig hervortritt. Bei den Krebsmuskeln liegen die technischen Verhältnisse infolge der größeren Dimensionen und der derberen Konsistenz wesentlich einfacher. Die Untersuchung muß stets bei völlig erweiterter Blende erfolgen, erst um an fixierten Präparaten die näheren Beziehungen zwischen Nerv und Muskel zu studieren, kommt die Abblendung des Lichtes in Betracht. Zur Fixierung eignen sich sämtliche Stellen, wo sich überhaupt etwas von Nervenfärbung gezeigt hat; denn erst an den im Xylol völlig aufgehellten Präparaten ist die störende Lichtbrechung der Muskelfaserkonturen und der Tracheen gänzlich beseitigt und können die feineren Verhältnisse hervortreten. Es zeigt sich übrigens, daß die Tracheen auch schon am frischen Präparate bei offener Blende so wenig sichtbar sind, daß sie trotz aller Verzweigungen bei der Methylenblaumethode unmöglich zu Verwechslungen Anlaß geben können, wie das z. B. bei der GOLGI-Methode in dem Maße in Betracht kommt, daß selbst Forscher wie CAJAL nicht zu einwandfreien Ergebnissen bei Insekten gelangen konnten. Hat man das Injektionsquantum nicht zu groß bemessen, so wird man auch durch keine Farbstoffniederschläge oder Mitfärbung anderer Gewebsbestandteile, wie Muskeln, Bindegewebe, Drüsen, gestört, und es zeigt sich eine so reine und klare Blaufärbung der Nerven inmitten des gelblich schimmernden Muskelgewebes, daß neben dem wissenschaftlichen Interesse, welches sich der wie auf dem Präsentierteller aus-

1) 1890, Arch. f. mikrosk. Anat., p. 311.

gebreiteten Strukturverhältnisse bemächtigt, auch der ästhetische Genuß, der sich hier dem für die Kunstformen der Natur empfänglichen Auge bietet, die technischen Mühen belohnt und für manche mißglückte Färbung reich entschädigt.

C. Ergebnisse.

I. Bau der marklosen Nerven der Arthropodenmuskeln.

1. Achsencylinder und Fibrillen.

Schon bei VALENTIN und HELMHOLTZ (1842) bestehen die Nerven des Flußkrebses als des geeignetsten Untersuchungsobjektes unter den Wirbellosen aus Fibrillen, welche durch Bündel oder Membranen fibrillären kernhaltigen Bindegewebes miteinander verbunden sind. Bei Insekten fehlen den zarteren Bindegewebsmembranen die Kerne und fehlen vor allem Nervenfibrillen, welche denen der markhaltigen Wirbeltiernerven glichen [1]). Es scheint mir das der erste Hinweis auf das allgemeine Fehlen markhaltiger Nervenfasern bei Insekten zu sein, abgesehen von der von ACKERMANN, REIL, BICHAT aufgestellten und von JOHANNES MÜLLER (1828) durchgeführten Analogie des Eingeweidenervensystems der Insekten mit dem Sympathicus der Wirbeltiere. Daß andererseits bei den Krebsen auch markhaltige Nervenfasern vorkommen, haben bereits EHRENBERG (1836) und HANNOVER beschrieben, RETZIUS und FRIEDLÄNDER wieder hervorgehoben [2]).

HELMHOLTZ' „Fibrilla nervea" entspricht dem zuerst bei Wirbeltieren als „Achsencylinder" (PURKINJE) bezeichneten Nervenelement, während die in jener Zeit vielgebrauchte Bezeichnung der „Nervenprimitivröhre" auch die Achsencylinderscheide mitumfaßt. Im Zentrum der damals als Cylinder mit flüssigem Inhalt angesehenen Primitivröhren des Bauchstranges des Flußkrebses fand bekanntlich REMAK zuerst das „zentrale Faserbündel" [3]). Ein Bündel scheint ihm hundert bis einige hundert der sehr zarten, glatten, miteinander parallelen Fasern zu enthalten. REMAK hat also zweifellos zuerst den fibrillären Aufbau des Achsencylinders gesehen, wie auch BETHE [4]) hervorhebt. Ob REMAK dieselben Strukturelemente sah, welche KUPFFER in den markhaltigen Wirbeltiernerven und APÁTHY bei Wirbellosen mit vollendeter Mikrotechnik färberisch differenzierten, ist schwer zu sagen. BETHE glaubt es

1) HELMHOLTZ, p. 7. — 2) FRIEDLÄNDER, p. 256 Anm. — 3) 1838, Dissertation, und MÜLLERS Archiv, 1843, p. 197. — 4) Allgemeine Anat., p. 13.

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

nicht. APÁTHY[1]) gesteht noch nicht einmal MAX SCHULTZE zu, die Primitivfibrillen wirklich gesehen zu haben, REMAK, LEYDIG und HAECKEL erwähnt er gar nicht erst. Daß MAX SCHULTZE sie in den peripheren Nervenfasern wirklich dargestellt hat, hält BETHE dagegen für zweifellos[2]). Auch ich halte es für sicher, z. B. in MAX SCHULTZES Fig. 17c auf p. 109 in STRICKERS Handbuch wirkliche Primitivfibrillen aus dem Olfactorius des Hechtes vor mir zu sehen. Ebenso glaube ich aber auch aus REMAKS obiger Beschreibung schließen zu dürfen, daß schon dieser Forscher die letzten bis jetzt gefundenen fibrillären Elemente gesehen hat, und wenn seine zentralen Fasern wirklich nicht die Primitivfibrillen selbst gewesen sein sollen, so sind es mindestens Aggregate von wenigen derselben gewesen, also jedenfalls eine tiefere Ordnung als der Achsencylinder. Für reine Sophistik halte ich es, wenn man behauptet, jene älteren Forscher hätten nur die Interfibrillärsubstanz gesehen, die durch die Fibrillen häufig ein fibrilläres Aussehen bekomme; denn wenn sie die streifige Teilung jener Substanz durch die Fibrillen sahen, so sahen sie eben auch die Grenzen der Fibrillen. Die älteren Meister haben schon manches mit den einfachsten Werkzeugen gesehen, zu dessen Sichtbarmachung wir komplizierter Methoden nicht mehr entraten zu können glauben.

Uebrigens scheint weder APÁTHY noch BETHE noch sonst im allgemeinen bekannt zu sein, daß schon ERNST HAECKEL 1857 eingehend begründete, was stets nur als MAX SCHUTZES oder APÁTHYS Fibrillentheorie dargestellt wird. HAECKEL suchte die wiederholte Teilung der Nervenprimitivröhren des Krebses in ihrem peripheren Verlaufe mit dem dadurch anscheinend verletzten physiologischen Fundamentalgesetz von der isolierten Leitung in Einklang zu bringen und schloß, daß die einzelnen Fasern des Achsenbündels die „wahren letzten Formelemente der Nerven“ seien. „Die Nervenröhrenverzweigungen würden sich nach dieser Auffassung natürlich viel einfacher von selbst erklären, da die Röhren, welche wir ursprünglich als Primitivelemente auffaßten, nun zum Werte einer bloßen schützenden und zusammenhaltenden Scheide herabsinken, welche die wahren Primitivfasern in Bündel zusammengefaßt zur Peripherie leiten. Den einzelnen Fäserchen fiele dann die isolierte Leitung anheim,

1) 1897, p. 510. — 2) Allgem., p. 15.

welche sie, nicht mit der Röhre sich verzweigend, gegeneinander selbständig behaupten würden“ [1]). Ursprünglich hatte HAECKEL mit REMAK den gesamten Inhalt der Nervenprimitivröhren dem Achsencylinder gleichgesetzt, war jedoch dann der Anschauung von LEYDIG beigetreten [2]), welcher das Zentralbündel allein für den Achsencylinder in Anspruch nahm.

Wir finden demnach die Fibrillentheorie schon 1857 von HAECKEL morphologisch wie physiologisch ausgesprochen, anatomisch von REMAK bereits begründet. Die weiteren Forschungen seit jener Zeit haben uns nur die morphologischen Fundamente zu einem sicheren und festen Bau erhoben, die physiologische Seite ist seit HAECKEL unverändert geblieben bis auf die größere Wahrscheinlichkeit, welche sie durch die Befestigung ihrer anatomischen Grundlage erfahren hat; doch zweifellos müssen wir uns mit BETHE bewußt bleiben, daß anatomische Tatsachen keine bindenden Schlüsse auf eine Funktion zulassen [3]). Demnach verfällt auch einstweilen die Berechtigung, den Primitivfibrillen, Elementarfibrillen, Neurofibrillen ein Eigenschaftswort hinzuzufügen, welches ihnen eine physiologische Eigenschaft beilegt, wie der Zusatz „leitend“.

MAX SCHULTZE gebührt allerdings der Ruhm, die Primitivfibrillen als allgemeines Strukturelement der nervösen Substanz näher charakterisiert und aus den schon bestehenden Ausdrücken Nervenfibrille (bei HELMHOLTZ), Faserbündel (REMAK), Primitivfaser (LEYDIG), Primitivbündel, Fäserchen (HAECKEL) das „Primitivfibrillenbündel“ geprägt zu haben.

LEYDIG bezeichnet auf Grund von Studien an Arthropodennerven die „fibrilläre Punktsubstanz“ als den eigentlichen Grundstoff der Nervenfasern, die wesentliche Nervenmaterie [4]). In den Nervenfasern setzen sich Längszüge dieser Substanz zu neuen Einheiten zusammen, also bereits genau wie sich APÁTHY die Elementarfibrillen aus Längsreihen von Neurotagmen zusammengesetzt denkt [5]). Die marklose Nervenprimitivfaser kann nach LEYDIG durch innige Vereinigung der feinsten Fäserchen ein anscheinend homogenes Aussehen gewinnen [6]).

Schon nach LEYDIG und SCHULTZE [7]) findet sich in den Fibrillenbündeln der meisten Wirbellosen eine interfibrilläre körnige Substanz, welche übrigens die isolierte Leitung ermöglichen soll [8]).

---

1) 1857, p. 483. — 2) Ebenda p. 478. — 3) 1898, p. 403. — 4) 1864, p. 225. — 5) 1897, p. 508. — 6) 1864, p. 92. — 7) 1871, p. 116. — 8) Ebenda p. 118.

Jene haben also allerdings die Interfibrillärsubstanz gesehen.

Als Inter- oder Perifibrillärsubstanz bezeichnen APÁTHY und BETHE die Flüssigkeit — vielleicht von ölartiger Konsistenz (APÁTHY) —, in welcher die mehr festen Primitivfibrillen frei beweglich sind[1]). Diese Perifibrillärsubstanz färbt sich bei der Methylenblaumethode oft zuerst, beginnend von der Oberfläche[2]), so daß ein derartiges Präparat eine dünnwandige, hellblaue Röhre mit fast farblosem Inhalt darstellt. Taf. 1, Fig. 2, 3[5]) zeigen einige Achsencylinder mit Verzweigungsstellen durch die beschriebene Tinktion der Perifibrillärsubstanz angedeutet. In Fig. 3 fällt auch die verschiedene Dicke und Färbung der Achsencylinder auf, wie sie auch in Fig. 12, 17, 22 zu sehen ist. Auf den außerordentlich schwankenden Durchmesser der in derselben Bindegewebsscheide verlaufenden Nervenprimitivröhren des Krebses und anderer Arthropoden haben schon HAECKEL und LEYDIG hingewiesen. Wie HAECKEL gibt auch HUXLEY[3]) deutliche Abbildungen dieser Verhältnisse, welche BIEDERMANN[4]) genauer untersucht und für Hydrophilus piceus bestätigt hat. Da der Achsencylinder aus einem Bündel von Primitivfibrillen oder aus einigen oder nur einer derselben bestehen kann, so erklärt sich die verschiedene Dicke der Achsencylinder anatomisch aus der verschiedenen Anzahl der ihn zusammensetzenden Fibrillen. Auf die Dicke wie die Anzahl der in demselben Nerven enthaltenen Achsencylinder werden wir bei Besprechung der Nerventeilung zurückkommen.

2. Die Nervenscheide.

Seit LEYDIG und MAX SCHULTZE betrachten wir die Achsencylinder der marklosen Nerven als direkt von dem festen Bindegewebe einer kernhaltigen, mehrschichtigen fibrillären Scheide umgeben. LEYDIG[6]) unterscheidet bei Käfernerven eine „glashelle Haut“ aus homogener gestreifter Grundsubstanz und Kernen und eine zu dieser gehörige innere kernhaltige Epithellage als „inneres Neurilemm“, wobei die Epithellage als „Matrix“ aufgefaßt wird, und andererseits als „äußeres Neurilemm“ das mehr lockere, zellige Bindegewebe, welches mit den umgebenden Teilen, wie Gefäßen und Tracheen, in Verbindung steht. Das äußere Neurilemm entspricht wohl dem „Perineuralsinus“ von APÁTHY[7]), welcher in ihm bei Astacus die Zellgrenzen darstellen konnte. Bekanntlich unterscheidet

1) BETHE, 1898, p. 390. — 2) Ebenda p. 388. — 3) p. 87. — 4) 1887. — 5) Dieser Arbeit. — 6) 1864, p. 214. — 7) 1897, p. 539.

APÁTHY noch eine „Gliascheide", welche innerhalb der „Neurilemmscheide" (das innere Neurilemm LEYDIGS) die einzelnen Neurofibrillen mit ihrer speziellen Interfibrillärsubstanz umfaßt.

Die bindegewebige Nervenhülle ist unter anderen von KÜHNE [1]) bei Hydrophilus, von MAZZONI bei Oedipoda, von RINA MONTI bei verschiedenen Insekten beschrieben worden. BIEDERMANN [2]) unterscheidet bei Astacus fluviatilis „die mächtige Bindegewebsscheide, welche die Achsencylinder umhüllt und deren einzelne konzentrische Schichten in der Nähe der letzteren am dichtesten gelagert, nach außen hin lockerer werden", als „Nervenscheide" von der jeden einzelnen Achsencylinder umhüllenden „Achsencylinderscheide", ein Unterschied, welcher wieder dem äußeren und inneren Neurilemm entspricht. Auf Taf. 1, Fig. 3 kann man sehr deutlich zwei Schichten der Nervenscheide erkennen. Zunächst umziehen fibrilläre Bindegewebszüge, an einigen Stellen zart mit Methylenblau tingiert, die beiden Achsencylinder der primären wie sekundären Nervenfaser. Nach außen kommt dann eine mehr feinkörnige, etwas schwächer lichtbrechende Hülle mit rundlichen, peripherwärts länglicher und schmaler werdenden Kernen, von welchen an anderen Stellen des Präparates sich ebenfalls einige schwach mit Methylenblau gefärbt haben, während die übrige äußere Scheide völlig ungefärbt blieb. Die äußere Hülle ist an einer Stelle eingerissen, und die inneren Bindegewebszüge beweisen ihre größere Elastizität und Festigkeit durch ihren unverletzten Zustand. Meist bekommt man übrigens bei der hauptsächlich auf die Darstellung der Achsencylinder und ihrer Endigungen gerichteten Methode nur die innere Hülle reich entwickelt zu sehen, wie z. B. in Fig. 17. Außer bei den Heuschrecken habe ich wenigstens die äußere zellige Hülle bei keinem Insekt gesehen, vermag aber nicht zu entscheiden, ob es sich hier etwa um einen Ordnungsunterschied handelt. Die kernhaltige Nervenscheide findet sich übrigens schon auf einer LEYDIGschen Abbildung des Sehnervenstabes des Krebses aus dem Jahre 1855.

II. Verlauf und Verzweigung der marklosen Muskelnerven.

Während HELMHOLTZ noch im Anschluß an VALENTIN von den Aequivalenten der Achsencylinder berichtet: „simplices decurrunt per nervos, numquam in ramos dividuntur neque in nervis simplicibus neque in plexibus nervorum" [3]), beschreibt HAECKEL zuerst „die schönsten und deutlichsten Gabelteilungen" derselben: „Alle

1) 1859, p. 572. — 2) 1887, p. 6. — 3) 1842, p. 5.

Nervenprimitivröhren der Decapoden teilen sich wiederholt während ihrer ganzen peripheren Ausbreitung, und zwar gehen fast bei jeder Gabelung eines Stämmchens die meisten dasselbe zusammensetzenden Röhren, ebenso wie jenes selbst, in je zwei divergierende Aeste, von gleichem oder verschiedenem Durchmesser, auseinander“ [1]). Er konnte diesen von ihm auch deutlich abgebildeten Teilungsmodus bis in die 4. bis 6. Ramifikation verfolgen und beobachtete auch dabei „die ungemein große Verschiedenheit im Durchmesser nicht nur der dicht aneinanderliegenden Röhren, sondern auch der verschiedenen Aeste einer und derselben, so daß bald beide Zwillingsäste ganz gleich sind, bald der eine den anderen um das 10—15fache übertrifft“ [2]). Erst BIEDERMANN hat dieses eigenartige Verhalten wiedergefunden und weiter verfolgt.

1. Im Oeffnungsmuskel der Krebsschere

fand er mit der Goldmethode wie mit Methylenblau in einer dicken kernhaltigen „Nervenscheide“ stets zwei Achsencylinder, in der Regel von verschiedenem Durchmesser, welche sich bis in die feinsten Verzweigungen ausnahmlos an einer und derselben Stelle teilten [3]). Ich konnte diese Befunde in jeder Hinsicht bestätigen, und es gelang mir, das gesamte Innervationsgebiet des Oeffnungsmuskels nach vitaler Färbung zu genauerem Studium in Ammoniummolybdatlösung zu fixieren. Ich gebe der Raumersparnis halber das Uebersichtsbild schematisch (Textfigur 1, p. 30), während Tafel 3, Fig. 21 nur die Nervenversorgung der distalen Hälfte des Muskels darstellt. Zur Orientierung über die Lage des Oeffnungs- und Schließungsmuskels in dem chitinigen Exoskelett des Propodits der Krebsschere diene die Abbildung von HUXLEY auf p. 80 seiner berühmten Monographie „Der Krebs“. Daraus wird auch im Vergleich mit meiner Textfigur verständlich, daß der Nerv in den symmetrisch gefiederten Muskel von dessen Ursprunge her eintreten muß und sich parallel mit der Sehne verlaufend nach deren stark verdicktem Ende hin in seine Endverzweigungen auflöst, so daß sich die primären Seitenäste des Hauptstammes in ihrer Richtung mit der der Muskelfasern kreuzen, da diese nach dem Sehnenende zu konvergieren. Die beiden mit ihrer gemeinsamen Nervenscheide als Mediannerv in gerader Richtung über die Oberfläche des Muskels hinziehenden Achsencylinder unterscheiden sich stets mehr oder minder in ihrem Kaliber, in der Regel ist der dünnere tiefer gefärbt. Man kann beiderseits 5—7 Haupt-

1) 1857. p. 480. — 2) Ebenda p. 537. — 3) 1887, p. 4.



Fig. 1. Innervation des Scherenöffnungsmuskels von Astacus fluviatilis. *s* die Sehne des Muskels. *a* und *b* die beiden Achsencylinder des Mediannerven, welcher sich diplotomisch verzweigt. *e* äußeres, *i* inneres Neurilemm. α und β Zwillingsachsencylinder niederer Ordnung. Schematisiert.

Mediannerven abgehen sehen, dichotomische Teilung seiner beiden Achsencylinder entstehen und von einer Fortsetzung der Nervenscheide umhüllt sind. Während die Hauptäste der beiden Seiten sonst nie symmetrisch von derselben Stelle des Mediannerven entspringen, teilt sich dieser schließlich in die zwei letzten, gleich starken Hauptäste, von welchen der eine oft als die eigentliche Fortsetzung des Hauptnerven erscheint (vergl. Tafel 3, Fig. 21), während meist beide von der bisherigen Richtung desselben divergieren (vergl. Textfigur 1). Wie der Mediannerv stets die gerade Richtung einhält und höchstens an den Austrittsstellen der Hauptäste sehr stumpfe Winkel bildet, so halten auch die primären Seitenzweige die bald nach dem Abgange eingeschlagene Richtung in der Regel inne; manchmal verlaufen sie indessen auch in Zickzacklinien, von deren spitzen Winkeln die weiteren Seitenzweige abgehen (siehe Tafel 3,

Fig. 21 bei *a* und *b*), ein Verhalten, wie es besonders bei den letzten Teilungen wiederkehrt und sicher nicht als Kunstprodukt infolge mechanischer Insulte aufzufassen ist; endlich können sie auch von vornherein einen völlig unregelmäßigen Verlauf annehmen. Meist ist eine gewisse Symmetrie in Verlauf und fernerer Verzweigung der ungefähr in gleicher Höhe entspringenden Hauptzweige zu beobachten. Feinere und kürzere Aeste scheinen nur ausnahmsweise vom Hauptstamm direkt abzuzweigen; in solchen Fällen ist auch die bindegewebige Scheide entsprechend dünner. Man sieht die Achsencylinder bis zur nächsten Verzweigung oft wieder an Dicke zunehmen, ohne daß es den Eindruck machte, daß diese Verdickung durch ein Zusammenschnurren des Nerven oder eine der später zu besprechenden Varikositäten bedingt wäre.

Bei allen weiteren Teilungen wiederholen sich die gleichen Vorgänge. Nicht selten zweigen die Aeste im spitzen Winkel rückwärts ab; es scheint dies besonders dann vorzukommen, wenn auf eine längere Strecke vorher keine Verzweigung auf derselben Seite stattfand (Tafel 3, Fig. 21 bei *c*), und findet seine Analogie in der von Haeckel beschriebenen und abgebildeten rückläufigen Teilung der Röhren in den größeren Nervenstämmchen des Krebses.

Bemerkenswert erscheint, daß die Wurzeln der abzweigenden Achsencylinder vielfach durch kegelförmige, dunkler tingierte Verdickungen charakterisiert sind, welche mit ihrer Grundfläche dem Achsencylinder höherer Ordnung aufsitzen. Doch habe ich ebensowenig an diesen Teilungsstellen wie sonst an den Krebsnerven wirkliche Kerne gesehen.

Die größeren Nervenzweige laufen über mehrere Muskelfaserbündel hinweg und geben denselben Aestchen ab, oft findet die ausgiebigere Teilung erst in einem fernen Gebiete statt, welches gleichzeitig von den autochthonen Nervenelementen versorgt wird. Auf den breiten Muskelfasern verlaufen dann meist die feinen Doppelnerven, deren beiderseitige Aestchen nach Uebergang der Nervenscheide ins Sarkolemm sich innerhalb des letzteren verzweigen und die kontraktile Substanz umfassen, umspinnen (Fig. 23), ohne jedoch auch nur Spuren von Anastomosen und Netzen zu bilden. Ich habe noch in keinem quergestreiften Skelettmuskel eines Arthropoden auch nur mit einiger Sicherheit eine nervöse Anastomose gesehen.

Der Doppelverlauf der Muskelnerven läßt sich, wie wir sehen werden, beim Oeffnungsmuskel der Krebsschere bis unter das Sarkolemm in die feinsten, mit

der kontraktilen Substanz in Kontakt stehenden Endigungen verfolgen. (Textfigur 8, p. 47, und Tafelfig. 23). Ich möchte die gleichzeitige dichotomische Teilung zweier zusammengehöriger, parallel laufender, von gemeinsamer Nervenscheide umhüllter Achsencylinder, deren allgemeinere Bedeutung wir noch kennen lernen werden, der Kürze halber als „diplotomische Nervenverzweigung" bezeichnen.

Von der überaus reichen Nervenverzweigung in dem in Rede stehenden wie in anderen Krebsmuskeln bekommt man nur selten an stellenweise besonders gut gefärbten Präparaten den richtigen Begriff. Es darf wohl angenommen werden, daß die einzelnen Fasern des zierlichen Muskels in annähernd gleicher Weise innerviert werden. Daraus würde folgen, daß stets noch viele Nervenzweige ungefärbt bleiben. Andererseits ist es höchst wahrscheinlich, daß sämtliche zu den Muskelfasern tretenden Achsencylinder dem oberflächlichen Mediannerven entstammen, da ich sie fast ausnahmslos bis in denselben verfolgen konnte. Nur ein einziges weiteres nervöses Gebilde zeigt sich manchmal am Oeffnungsmuskel gefärbt. Es gleicht ungefähr den mehrfach beschriebenen „sensorischen Schläuchen" und besteht aus einem dicken Bündel von feinen, anscheinend nur aus je einer Primitivfibrille bestehenden, wellig verlaufenden Achsencylindern und seiner zarten, kernhaltigen Bindegewebsscheide. Dieser Nerv läuft oberflächlich neben dem Mediannerv her, ohne daß ich je irgend eine Teilung oder Verzweigung aufzufinden vermochte. Auch Ursprung und Ende habe ich nicht ergründet. Vielleicht ist es die sensible Leitung von der ja sehr empfindlichen Scherenhaut her. Nicht mit völliger Sicherheit könnte ich bis jetzt auch dem Einwande begegnen, daß dieses Fibrillenbündel eigentlich zu dem

2. Schließmuskel der Krebsschere

gehört, welcher mit seiner Hauptfläche der Oberfläche des Oeffnungsmuskels anliegt, und zwar so, daß beide nur durch das Bindegewebe getrennt sind, welches die herantretenden Nerven und Gefäße locker umhüllt. An der Oberfläche dieses gleichfalls gefiederten Muskels zeigt sich nämlich ein gleicher Nerv, meist von doppelter Stärke und oft in zwei getrennten parallelen Portionen ungefähr median längs verlaufend. Hier finden sich auch nicht allzu selten Verzweigungen, welche ich jedoch noch nicht einwandsfrei als Muskelnerven nachweisen konnte. Einen anderen Hauptstamm bringt indessen unsere Methode im Scherenschließer nicht zur Darstellung. Die feineren

Aeste der Muskelnerven färben sich auch nur sehr unregelmäßig und stellenweise, doch gelingt es, die Analogie ihres Verhaltens mit dem am Oeffnungsmuskel zu beobachten. BIEDERMANN hat bereits auf den außerordentlichen Unterschied in der Methylenblaufärbbarkeit der Nerven an diesen zwei antagonistischen Muskeln hingewiesen und das bemerkenswerterweise ebenso verschiedene Verhalten gegenüber der Goldmethode hervorgehoben. Doch hat er mit der letzteren auch am Schließmuskel wichtige Befunde erhoben: in den größeren Stämmchen verlaufen in der Regel mehrere Achsencylinder, bis 6 an der Zahl, von welchen je ein stärkerer und ein feiner ihre Zusammengehörigkeit dadurch beweisen, daß sie sich an derselben Stelle teilen. Von den größeren Stämmchen gehen zwar mehrere Zweige gleichzeitig ab, doch meist nicht von allen Achsencylindern einer, die feineren führen nur noch 4 Achsencylinder, die Endästchen bilden sich aus je zweien derselben wie beim Oeffnungsmuskel. Einige Abbildungen veranschaulichen die eigenartigen Ergebnisse.



Fig. 2. Die vier Achsencylinder eines Nerven des Scherenschließmuskels von Astacus fluviatilis mit zwei Teilungsstellen. *c* und *d* variköse Fasern.

Die Textfigur 2 zeigt, nach einem frischen Präparate gezeichnet, die auffallende Verschiedenheit von 4 ein Nervenstämmchen im Schließmuskel zusammensetzenden Achsencylindern in ihrer Dicke, Färbungsintensität und Struktur, wie andererseits die gleichzeitige Teilung von dreien derselben. Bei *c* und *d* sieht man an den Verzweigungsstellen die oben beim Oeffnungsmuskel erwähnten Verdickungen. Besonders eigenartig ist das Verhalten der glatten, bandartigen Faser *b*, welche nicht an der Verzweigung teilnimmt.

3. Die übrigen Skelettmuskeln von Astacus,

deren Nerven sich meistens leicht mit Methylenblau färben, bieten von vornherein kein so hohes physiologisches Interesse wie die auf die Eigenschaften ihrer Nerven genau studierten Scherenmuskeln,

doch sind sie auch bereits von BIEDERMANN [1]) zum Gegenstand eingehender Untersuchung gemacht worden. Ich will besonders bestätigend hervorheben, daß in den Nervenscheiden der Mediannerven, welche die antagonistischen Muskeln des nächsten Gliedes des Scherenarmes (Carpopodit) versorgen, wie in denjenigen der größeren Glieder der Gehfüße (Meropodit), sich einige dicke Achsencylinder finden, welche, sich zu mehreren gleichzeitig teilend, ihre Aestchen an die Muskulatur abgeben, und dazwischen Bündel von ganz feinen Fasern. Bei letzteren habe ich keine Teilungen im Muskelgebiet beobachten können, halte es daher nicht für unmöglich, daß wir hier einen gemischten Nerven vor uns haben, falls es zutrifft, daß die nun mehrfach angetroffenen Fibrillenbündel sensorische Leitungsbahnen darstellen.

In diesen wie in den dorsalen und ventralen Muskeln des Schwanzes und den dorsalen des Thorax, demnach also bei allen bei Astacus fluviatilis daraufhin untersuchten Skelettmuskeln läßt sich mit der Methylenblaumethode zeigen, daß die zu den Muskelfasern tretenden Nervenästchen zwei Achsencylinder führen, welche der wiederholten gleichzeitigen dichotomischen (diplotomischen) Teilung der Achsencylinder höherer Ordnung entstammen.

4. In den Muskeln der Heuschrecken

untersuchte zuerst wohl MAZZONI Bau und Verlauf der Nerven. Aus seiner Beschreibung und den sehr klaren, nach Goldpräparaten gezeichneten Abbildungen geht hervor, daß er bei Oedipoda fasciata in den kernhaltigen und aus einer „sostanza granosa fibrillare" bestehenden Nervenscheiden einen oder zwei Achsencylinder beobachtete. An den letzten Verzweigungen verschwindet die Scheide, und der nackte Achsencylinder teilt sich in seine meist frei oder in Knöpfchen ausgehenden Endigungen. Ohne es im Text zu erwähnen, bildet MAZZONI auch die gleichzeitige Teilung der Zwillingsachsencylinder in der Nervenhülle und den weiteren doppelten Verlauf im Muskel deutlich ab.

RINA MONTI fand bei anderen Orthopteren, Locusta viridissima, Bacillus Rossii, Gryllus campestris, mit der Methylenblaumethode einen dem Achsencylinder äquivalenten „cordone centrale" in der leicht längs gestreiften oder unregelmäßig granulierten Nervenscheide [2]). Dieser Mittelstrang verlief selten mit den untereinander parallelen Scheidenrändern parallel, in der Regel wand er sich in wellenförmigen

1) 1887, p. 14ff. — 2) 1891, p. 3, 4.

Krümmungen innerhalb der Hülle. Die mehrfache Beobachtung zweier Achsencylinder in gemeinsamer Hülle durch Fräulein MONTI wurde schon in dem historischen Ueberblick erwähnt. Den außerordentlichen Nervenreichtum der Insektenmuskeln charakterisiert die Forscherin treffend mit den Worten: „La ricchezza dei nervi, specialmente nei muscoli degli arti posteriori delle locuste, è così grande che le mie descrizioni non ne possono dare un'idea."

Vielleicht können meine nach Dauerpräparaten angefertigten Zeichnungen die Fülle der nervösen Elemente in den Insektenmuskeln besser veranschaulichen als alle Beschreibungen. Dabei muß noch bemerkt werden, daß meistens nur die in einer Ebene sichtbaren Nerven zur Darstellung kamen, während die in den anderen Einstellungsebenen erscheinenden ungezeichnet blieben, um die Uebersichtlichkeit des Bildes nicht zu beeinträchtigen. Von den Orthopteren gelang die Nervenfärbung besonders schön und elektiv bei dem Warzenbeißer, Decticus verrucivorus, dessen Thoraxmuskeln ich wie auch die Femoralmuskeln seines Sprungbeins untersuchte.

An den im Thorax längs und quer gelegenen, in länglichrechteckige Partieen zerfallenden Muskeln sieht man, wie die nach einem fixierten Präparate etwas schematisierte Textfigur 3, p. 36, andeutet, in der Mittellinie dieser Muskelrechtecke zwischen den hier etwas auseinanderweichenden Faserbündeln in einer dichten, doppelschichtigen Bindegewebsscheide zwei verschieden stark gefärbte Achsencylinder meist verschiedenen Kalibers in gerader Richtung längs verlaufen. Oft zeigt sich nur ein Achsencylinder, doch beruht dieser Befund wohl mit Sicherheit auf unvollständiger Färbung, da anzunehmen ist, daß die gleichen Muskeln desselben Tieres in einheitlicher Weise innerviert werden, so daß auch hier wieder der Zwillingsnerv als Regel erscheint. Von diesem Mediannerven gehen die zur Richtung desselben und der Muskelfasern etwa im rechten Winkel verlaufenden Seitenäste im Gegensatze zu dem am Oeffnungsmuskel der Krebsschere beschriebenen Verhalten meistens beiderseits auf gleicher Höhe ab, indem sie hier meist einer gemeinsamen Wurzel entstammen. Auch in ihnen läßt sich die Doppelnatur oft bis in die feinsten Verzweigungen verfolgen. Wenn irgendwo, so ist man hier berechtigt, von baumförmigen Nervenverästelungen oder Nervenbäumchen zu sprechen. Bei der manchmal in der ganzen Dicke der Muskelbündel gelungenen Färbung kann man an den Totalpräparaten oft von der Seite, in schräger Richtung oder von oben in das sich äußerst plastisch und zierlich



Fig. 3. Innervation eines Thoraxmuskels von Decticus verrucivorus. *a* und *b* die beiden Achsencylinder des Mediannerven, welcher sich diplotomisch verzweigt. *e* äußeres, *i* inneres Neurilemm. *c* baumförmige Endverzweigung. α und β Zwillingsachsencylinder niederer Ordnung. Schematisiert. Zeiß B 1.



en hineinsehen. Leider kann
arstellung die Plastizität des
chen, auch immer nur wenige
bringt z. B. Taf. 1, Fig. 2 mit
umform zur Anschauung; man
ylinder wurzeln und die beiden
e nach vielfacher Teilung zur
wo ihre letzten Enden, wie
em Sarkolemm die kontraktile
ein anderes Nervenbäumchen
estchen der letzten gabeligen
gegengesetztem Sinne auf der
it deren Längsachse, wie auf
von diesen Endästchen her die
. 2 und 4 bis in den Haupt-
t sich zweifellos in diesen Prä-
llständigkeit gefärbtes Nerven-
ven die mehrfach aufgestellte
es Achsencylinders in einer fort-
mensetzenden Primitivfibrillen
aß die Wurzel des Bäumchens
enthält. Die Zahl derselben in
Mediannerv der Muskelpartieen
e danach bei Hinzurechnung all
hen hoch in die Tausende gehen.
n zum mindesten 170 Primitiv-
höherer Ordnung eine dement-
reichen anderen Beobachtungen
keit hervorzugehen, daß, wenn
linder höherer Ordnung
einiger sie zusammen-
schieht, doch diesem Teilungs-
tung zukommt, vielmehr die
die nur noch eine oder einige
r Weise vor sich geht, daß die

chter von oben in das Geäste
s sind die Verzweigungen ver-
net, daher an einigen Stellen
ern folgen wieder dem welligen

In den Femoralnerven des Sprungbeines von Decticus verzweigen sich die Nerven nach etwas anderem, wie bei Astacus unregelmäßigerem Typus. Wir sehen, daß auch für die Arthropoden der von ROLLETT[1]) auf Grund der Arbeiten von REICHERT und MAYS ausgesprochene Satz zu Recht besteht: „Jeder Muskel hat eine besondere Topographie seiner Nervatur."

Aus Fig. 5 ist ersichtlich, daß es auch zuweilen gelingt, den gemeinsamen Verlauf zweier Achsencylinder und ihre stets gleichzeitige Teilung nach Art der Eisenbahnschienenstränge weit zu verfolgen. Auch in dem Präparate, nach welchem Fig. 1 gezeichnet ist, lassen sich an vielen Stellen in den diffus hellblau tingierten Nerven bei genauerem Zusehen zwei dunklere Fasern erkennen. An den verbreiterten Teilungsstellen der stärkeren Stämmchen auf Fig. 1 sind übrigens mit einiger Wahrscheinlichkeit Nervenkerne zu beobachten. Sie sind durch ihre rötlich-violette Färbung und ein als Kernkörperchen imponierendes Gebilde ausgezeichnet. Wenn der aus der Tiefe tretende Nervenstamm nicht deutlich ist, ähneln daher die oberflächlichen Verzweigungen manchmal vielverästelten Ganglienzellen.

In den Beinmuskeln der Heuschrecken begegnen wir wieder jenen dickeren Bindegewebsschläuchen mit einer größeren Anzahl von feinen, fibrillenartigen Achsencylindern, wie sie oben beim Flußkrebs beschrieben wurden. Doch auch hier gelang es mir bis jetzt noch nicht, eine Beziehung der oft in größerer als Zweizahl den Hauptstamm verlassenden, sich von dessen Achsencylinder abzweigenden Fasern zu den Muskeln einwandsfrei festzustellen. Wie in den beschriebenen Nervenbündeln in den Muskeln von Astacus gleichen die meisten der Fasern in ihrer Zartheit und dem wellig geschlängelten Verlauf den Primitivfibrillen der „sensorischen Schläuche".

Ein höchst merkwürdiges Verhalten in der Teilung der Achsencylinder zeigt in Fig. 7 der in Fig. 3 von einem Stamme höherer Ordnung abgehende Thoraxmuskelnerv von Decticus, indem sich bei der Bildung der Seitenzweige in einigen Fällen beide Achsencylinder, in anderen nur einer derselben beteiligt. Ein ähnliches Verhalten kann man bei Hydrophilus und Astacus beobachten, bei diesen findet indessen die Nichtbeteiligung eines Achsencylinders an der Bildung der weiteren Verzweigungen anscheinend nur in denjenigen Nerven statt, welche mehr als zwei Stämmchen enthalten. Es macht nicht den Eindruck, als wenn es sich in Fig. 7 um unvollkommene färbe-

1) p. 30.

rische Darstellung handelte, man müßte denn einen tiefgreifenden chemisch funktionellen Unterschied zwischen einem Achsencylinder und seinem Zweige, von dessen Wurzel an, als Ursache der Indifferenz des letzteren gegenüber dem Farbstoffe voraussetzen. Ob hier wie auch sonst in den Skelettmuskeln der Arthropoden ein einfacher Nervenverlauf neben dem doppelten vorkommt, möchte ich nach anderen Erfahrungen zwar für unwahrscheinlich halten, muß es indessen nach dem eben Gesagten noch dahingestellt sein lassen.

5. In den Muskeln der Käfer

sind der Verlauf und die feineren Verzweigungen der Nerven noch kaum Gegenstand der Untersuchung gewesen, während nach KÜHNES Vorgang (1859) einige Forscher sich zum Studium der motorischen Nervenendigungen gelegentlich auch der Coleopteren bedienten. Ich habe die Methylenblaumethode hauptsächlich bei dem Maikäfer und den großen Wasserkäfern angewandt und besonders von Dytiscus marginalis und Hydrophilus piceus gute Präparate erhalten. Von den Nerven des letzteren wußte schon KÜHNE [1]), daß sie „eine deutliche kernhaltige Scheide erkennen lassen, welche schwach längsgestreift ist und den ziemlich dicken Nerven wie ein straffes Gewand umgibt". Er betont auch schon mehrfach, daß die motorischen Nerven der Käfer durch ihre außerordentlich zahlreichen Teilungen, die mit den Ramifikationen der Blutgefäße der höheren Tiere wetteifern könnten, sehr von denen der höheren Tierwelt abweichen [2]) [3]).

BIEDERMANN [4]) fand wie beim Krebs, so auch bei Hydrophilus „fast immer mehrere gefärbte Achsencylinder in einer gemeinsamen bindegewebigen und gänzlich ungefärbten Scheide". Sie unterschieden sich auch hier durch Dicke und Färbungsintensität und teilten sich wieder, wenn in der Zweizahl, gleichzeitig an derselben Stelle. Zahlreiche unzweideutige Zeichnungen erläutern diese Befunde.

Die Angaben KÜHNES und BIEDERMANNS konnte ich vollkommen bestätigen. Das Verhalten der Muskelnerven bietet bei Dytiscus keine wesentlichen Abweichungen von dem bei Hydrophilus. Ich gebe daher die an den Bein- und Thoraxmuskeln dieser beiden erhaltenen Ergebnisse zusammengefaßt wieder. Die Nervenscheide ist wie bei Astacus und Decticus gebaut und begleitet die Nerven bis zur Muskelfaser. Der Unterschied im Kaliber der einzelnen Achsen-

1) 1859, p. 572. — 2) 1859, p. 572. — 3) 1871, p. 150. — 4) 1887, p. 28.

cylinder eines Nerven ist oft so beträchtlich, daß der blasser und gleichmäßiger gefärbte um das 5—6-fache dicker ist als der dunklere, welcher körnig und manchmal varikös erscheint. An einigen Präparaten schien mir die tingierte perifibrilläre Hülle der dickeren Achsencylinder schmale dunkler gefärbte Kerne aufzuweisen. In manchen Nerven fand ich nur einige dickere Axone; vielleicht hatten sich die feineren Begleiter nicht gefärbt. Die umfangreicheren Schläuche mit zahlreichen fibrillenartigen, wellig verlaufenden Achsencylindern ließen sich auch hier wieder beobachten. Die feineren darin waren manchmal in kurze Längsstückchen auseinandergerissen, öfters zeigten sie spindelförmige Anschwellungen, in deren Bereiche die Intensität der Färbung vermindert war.

Ein wesentlich verschiedenes Verhalten der Nervenverzweigung in den einzelnen Muskeln, wie es sich bei dem Scherenöffner und in anderen Krebsmuskeln und auch bei den Thoraxmuskeln der Heuschrecken im Gegensatze zu deren Sprungbeinmuskeln zeigte, konnte ich in den Thorax- und Beinmuskeln der Wasserkäfer nicht beobachten. Die Nervenstämmchen treten meist in Begleitung der Tracheenstämmchen an die Muskeln und verlaufen anfangs in Zickzacklinien zwischen den mehr die gerade Richtung einhaltenden Tracheen. Trotz der reichen Verzweigungen der letzteren ist eine Verwechslung beider Elemente ausgeschlossen, da, wie bereits oben bemerkt, bei weiter Blende nur die gebläuten Nerven und erst bei Beschränkung des einfallenden Lichtes auch die Konturen der Tracheen sichtbar sind.

Fig. 10 gibt eine mehrfache diplotomische Verzweigung eines Zwillingsachsencylinders in einem dem Thoraxrückenschilde von Hydrophilus entnommenen Muskel wieder.

Ein in mehrfacher Hinsicht interessantes Präparat aus einem Muskel von Dytiscus stellen Fig. 17—19 dar. An der Bildung des obersten Seitenzweiges des Nervenstammes scheinen sich in Fig. 17 von den anfangs unterscheidbaren 3 Axonen nur *b* und *c* zu beteiligen. *c* teilt sich späterhin allein in einen selbständigen Ast c_1 und andererseits c_2, welcher mit Teilungsprodukten von *a* und *b* einen gemeinsamen Weg einschlägt. Die anderen beiden, der gleichzeitigen Hauptteilung von *a* und *b* entstammenden Achsencylinder biegen scharf um, und der dunklere von ihnen läßt sich durch a_1 und a_2 auf Fig. 18 und 19 viel verzweigt bis in seine Endigungen an den Muskelfasern verfolgen, während der andere bei *x* plötzlich aufzuhören scheint, zweifellos weil hier die weitere Färbung versagte. Dieses Präparat scheint mir den vollen Beweis und die denkbar größte Berechtigung für die Annahme zu liefern, daß die Doppelinner-

vation bei den Muskeln der in dieser Arbeit besprochenen Arthropoden die Regel ist, wenn es auch noch nicht gelingt, sie überall histologisch nachzuweisen. Es wird niemand annehmen wollen, daß sich das Teilungsprodukt von *b* bei *x* ohne weiteres in Wohlgefallen auflöse, obgleich es in dem Präparate so zur Darstellung kommt und der bis in seine Endigungen hinein lückenlos gefärbte Axon *a* nirgends mehr einen Begleiter aufweist; dieser Achsencylinder *b* wird vielmehr, wie schon vorher, entweder selbst oder durch seine Verzweigungen, als treuer Zwilling von *a* auch dessen fernere Wege teilen. Erst nach der letzten Doppelteilung kann dann noch die Frage entstehen, ob die Endigungen beider verschiedene oder die gleichen Muskelelemente innervieren, was später noch zu Gunsten des letzteren entschieden werden soll und für Astacus bereits entschieden ist (s. Textfigur 8, p. 47).

Fig. 20, nach einem Präparate aus einem Hüftmuskel von Dytiscus gezeichnet, führt die schon mehrfach erwähnte Fülle von Verzweigungen und Endigungen im Insektenmuskel in annähernder Vollständigkeit vor Augen[1]). Die Produkte der letzten gabeligen Teilungen legen sich wieder, meist in entgegengesetzter Richtung, parallel der Längsachse der Muskelfasern der Oberfläche derselben an, ein Verhalten, wie es auch in Taf. 4, Fig. 24 zum Ausdruck kommt. Die einzelnen Muskelfasern werden stets von mehreren Aestchen innerviert, so daß sie, wie schon KÜHNE wußte, eine ganze Anzahl von Nervenendigungen aufweisen. Daß andererseits auch die einzelnen feineren Nervenästchen mehrere Muskelfasern versorgen, zeigt sich deutlich in Fig. 13. Aus diesen beiden anatomischen Tatsachen ergibt sich, in wie vollkommenem Maße den Fasern der Insektenmuskeln die Möglichkeit geschaffen ist, alle zugleich den nervösen Reiz zu empfangen und mit ihrer rapiden Zuckung zu beantworten.

Von besonderem physiologischen Interesse würde es sein, die Innervation der die Flügel der Insekten bewegenden Muskeln, jener flinksten aller uns bekannten Muskeln, genau zu erforschen. Bisher haben nur CAJAL und CIACCIO gelegentlich die Nervenendigungen in den Flügelmuskeln, mit fragwürdigen Ergebnissen, untersucht. Auch hier ist offenbar die Methylenblaumethode geeignet, zum Ziele zu führen, wenn auch Färbung und Fixation hier anfangs auf anscheinend unüberwindliche Schwierig-

1) Auch hier mußten, um das in eine Ebene projizierte Bild nicht zu verwirren, aus verschiedenen Einstellungsebenen Nervenästchen weggelassen werden.

keiten stoßen, welche zum Teil in der klebrig-breiigen Beschaffenheit und der Undurchsichtigkeit der Muskelelemente, zum Teil auch in der nur sehr selten gelingenden Färbung der Nerven begründet sind. Doch würden sich an einem einzigen gelungenen und mit einigem Glücke fixierten Präparate schon viele Einzelheiten ergründen lassen. Ich habe bei Hydrophilus wie bei Dytiscus auf den Flügelmuskeln den Zwillingsverlauf von Achsencylindern gesehen, auch die gleichzeitige Beteiligung beider an der Verzweigung, doch besitze ich nur von Dytiscus zwei fixierte Nervenpräparate vom Flügelmuskel,



Fig. 4. Nervenverzweigung aus einem Flügelmuskel von Dytiscus marginalis. Zeiß C 2.

in deren einem teils 2, teils 4 Achsencylinder in derselben gemeinsamen Nervenscheide gefärbt sind. Eine andere Faser endet in einem ganglienzellenartigen Körper. Die reiche und sehr unregelmäßige Nerventeilung im Flügelmuskel kommt in der Textfigur 4 zum Ausdruck, welche nach dem anderen Dauerpräparate gezeichnet ist und keinen wesentlichen Unterschied mit der Innervation der Bein- und Thoraxmuskeln der Käfer aufweist. Nervennetze und Anastomosen waren auch hier nicht zu beobachten.

6. In den Muskeln der Schmetterlingsraupen

habe ich endlich ebenfalls mit der Methylenblaumethode einiges über Verlauf, Verzweigung und Endigungsweise feststellen können. Die besten Präparate erhielt ich von einer Raupe des Weidenbohrers, Cossus ligniperda, und konnte einige der Befunde beim großen Kohlweißling, Pontia brassicae, bestätigen. Von den Ganglien des Bauchstranges gehen beiderseits zwei divergente dicke Nervenstämme

nerven der übrigen Arthropoden einer zarter, blaß
färbt, der andere dunkler tingiert und varikös er
die diplotomische Teilung der Achser
Nervenstämmchens auch bei den Rau
und daß der Doppellauf derselben noch
Muskelfaser wiederzufinden ist, dürfte F
Fig. 12 einwandsfrei dartun. Letztere ist
fangs mit den Tracheen verlaufenden Musk
welche ich im Juni an einem Weider
satellitia?). An der Bildung des oberr
in der dicken Bindegewebshülle einge
durch dichotomische Verzweigung. D
bedeutenden Verdickungen an den
wie der äußerst geringe Kaliberun
merkenswert. Bei *x* und *y* ist
erkennen, welcher der Zweige
Hauptverlaufe sind im allger
cylinder zu unterscheiden. D
1 ursprünglich am höchster
ungeteilt um, während die
biegungsstelle eine zwei
Lage des herabgeschla
oder der untere Ast
gelegt hat, ist natu
bindung des Nerve
Gebiete des letzt
daher auch uner
funktionell unt
sammengehöre

In Fig.
nervösen F
zweigen
zu erker
störend
lücker
der

ine Anzahl feinerer Fäserchen
al weitere Teilungen eintreten.
n anzusprechenden Gebilde, an
llende Membran zu beobachten
oft recht beträchtlichen kern-
nsten Fäserchen verschwinden,
erkennen zu lassen. Auf den
Endgebiete von Tracheennerven
scheinlichkeit nach handelt es
solche dem Luftröhrensystem



Fig. 6.

von Cossus ligniperda. *tr* Tracheenast.

enast der Raupe von Cossus ligniperda.
D 3.

n gerade vorhandenen Atem-
die Oberfläche des Wassers
rehen und mit dem Hinterleibe
nter dem hinteren Rande der
en ihres Tracheensystems, aus
sblasen herausgepreßt wurden,
In dieser Stellung verharren
ssen sich weder durch das An-
sonstige nicht allzu heftige Be-

rührung in der Füllung ihres Körpers mit frischer Luft stören. Bläst man dagegen etwas Tabaksqualm gegen die aus dem Wasser hervorragenden Atemöffnungen, so schließen sich dieselben fast augenblicklich, und das Tier stößt steil in die Tiefe oder taucht wenigstens ein Stück weit unter. Offenbar ein Schutzreflex gegen atmungsschädliche Gase, welcher sensible Nerven in den Tracheen voraussetzt.

III. Endigungsweise.

1. Der Doyèresche Hügel und die Sarkolemmfrage sind, wie an den Muskeln der Wirbeltiere, so auch an denen der Arthropoden schon vielfach Gegenstand der Untersuchung gewesen, und man sollte erwarten, daß nunmehr eine gewisse Sicherheit in der Kenntnis beider bestünde, doch sind die Ansichten über Existenz und Bedeutung des ersteren noch recht widersprechend und nie einer zusammenfassenden Kritik gewürdigt, während andererseits die Frage nach dem Verhältnis von Nervenendfasern und Nervenscheide zum Sarkolemm noch neuerdings behandelt wird, als wenn nicht schon längst berufene Forscher einwandfreie Ergebnisse darüber erhalten hätten. So läßt Sihler an der letzten Jahrhundertwende die lange begraben geglaubte Lehre wieder erstehen, daß „die motorischen Endfasern der Nerven



Fig. 7. Nervenendigung an einem Muskel von Milnesium tardigradum. *m* Muskel. *n* Nerv. Nach Doyère 1840.

auf dem Sarkolemm liegen“[1]), und kann er, nachdem er „jahrelang und Tausende von Nervenendigungen angesehen“ hat, „nicht verstehen, wie man sagen kann, man könne sehen, daß die Schwannsche Scheide in das Sarkolemm übergehe“. Aus diesen Gründen scheint mir das Bedürfnis vorzuliegen, die bisherigen Ergebnisse vergleichend zu betrachten und durch neue zu ergänzen.

Doyère selbst beschreibt das von ihm zuerst beobachtete und abgebildete (s. Textfig. 7) Herantreten eines Nerven an die Muskelfaser folgendermaßen bei den Tardigraden: „Au moment d'arriver sur le muscle, le nerf s'épanouit et prend l'aspect d'une matière gluante ou visqueuse, qui serait coulée sur le muscle, l'envelopperait dans certains cas, le plus souvent s'étendrait sur une de ses faces en une couche de plus en plus mince, et dans une

1) p. 332, 333.

portion considérable de sa longueur, et peut-être même dans sa longueur tout entière“ [1]). Ein Neurilemm konnte Doyère wie auch später Greeff nicht finden, ein Sarkolemm erwähnt er nicht, „beide Gebilde — Nerv und Muskelfaser — sind bei dem Bärtierchen hüllenlos, nervöse und kontraktile Substanz berührten sich also direkt“ [2]), wie auch aus der historisch gewordenen Abbildung hervorgeht (s. Textfig. 7).

An den von Sarkolemm umhüllten Muskelfasern gestaltete sich der Nerveneintritt und mit ihm der Doyèresche Hügel schon wesentlich komplizierter. Leydig fand 1850, daß an den toten Muskeln eines Copepoden, Argulus foliaceus, die Hülle derselben ziemlich weit absteht und der Raum mit feinkörniger Masse und bläschenförmigen Kernen ausgefüllt ist [3]). Die Abbildung dieser Sarkolemmstruktur stimmt mit der im folgenden Jahre von einem anderen Crustaceen, Artemia salina, gegebenen überein [4]). Auf Grund weiterer Studien an Muskeln von Rochen und Haien wie auch Daphniden und an Insektennerven, wo er unter dem hellen, homogenen Neurilemm eine feine, körnige, kernhaltige Schicht entdeckte, kam Leydig zu dem Schlusse, „daß die aus glasheller Haut bestehende Neurilemmhülle das Abscheidungsprodukt der unter ihr gelegenen granulären, mit Nuclei versehenen Schicht ebenso ist, wie die Cuticula der äußeren Haut aus der unter ihr gelegenen Matrix hervorgeht“ [5]), und daß ebenso jene innerhalb des Sarkolemms befindliche Schicht die Matrix derselben sei. Leydig empfiehlt zur Untersuchung der motorischen Endigungen ganz besonders derartige Muskeln mit be-



Fig. 8. Diplotomische Verzweigung im „Nervenhügel“; aus dem Scherenöffnungsmuskel von Astacus fluviatilis. *a* und *b* die beiden zur Muskelfaser tretenden Achsencylinder. *ns* ihre gemeinsame Nervenscheide. *s* Sarkolemm. *sp* Sarkoplasma (Matrix Leydig). *q* quergestreifte Substanz der Muskelfaser. *1, 2, 3, 4* können sich noch weiter verzweigen. Schematisiert.

1) p. 346. — 2) Kühne 1871, p. 147. — 3) 1850, p. 327. — 4) 1851, p. 302. — 5) 1864, p. 72.

trächtlicher ausgebildeter Matrix unter dem Sarkolemm, „wie man es . . . auch bei Astacus fluviatilis antrifft“ [1]), und kommt selbst bereits zu dem Ergebnis, daß die von ENGELMANN im Gegensatz zu KRAUSE an der Innenfläche des Sarkolemms beobachteten „Endplatten“ der Muskelnerven ein Teil jener granulären, kernhaltigen Substanz und ihre Kerne denjenigen der letzteren gleichartig seien. Diese LEYDIGsche Anschauung scheint mir, wie folgender weiterer Hinweis: „Hat man Muskeln vor sich, wo die Matrix des Sarkolemms weniger stark oder nur durch Nuclei vertreten ist, dann erhält die sogenannte Endplatte mehr das Aussehen einer Bildung eigner Art, so z. B. bei Käfern (Dytiscus). In noch höherem Grade ist wohl letzteres der Fall bei Wirbeltieren“ [2]), dies also scheint mir von allergrößter Wichtigkeit zu sein für die Beurteilung vieler späterer Beschreibungen von Nervenendapparaten und besonders auch der KÜHNEschen Beobachtungen über die Struktur der Nervenhügel. Höchst merkwürdigerweise findet man fast nirgends sonst bei der Beschreibung von Muskelnervendigungen eine Andeutung jener Struktur zwischen Sarkolemm und kontraktiler Substanz, deren Vorhandensein allerdings, wie mich eigene Präparate belehrten, die Lage der Nervenenden bedeutend leichter erkennen läßt. Taf. 4, Fig. 23 möge einstweilen das Gesagte bekräftigen. Das Sarkolemm wird sonst stets nur als einschichtige zarte Membran genommen, welche durch ihre dichte Umschließung des quergestreiften Inhaltes der Muskelfaser das wahre Verhalten der Nerven verschleiert. Auch hierbei kommt es eben wieder sehr auf die geeignete Wahl des bequemsten Untersuchungsobjektes an.

LEYDIG fand übrigens bei Astacus den kontinuierlichen Uebergang der Nervenscheide in das Sarkolemm [3]), welches er also als Cuticularbildung jener Matrix auffaßt, zu welcher nach ihm auch das zwischen den kontraktilen Fibrillen befindliche Protoplasma, also Sarkoplasma, gehört.

KÜHNE, welchem dieser kontinuierliche, überall zwischen Sarkolemm und Muskelsubstanz gelegene Cylindermantel bei den Arthropoden ebenfalls bekannt war, sah auch bei Hydrophilus und Oryctes nasicornis den Nerven mit Zurücklassung der Scheide das Sarkolemm durchbrechen [4]) und den nackten Achsencylinder in die kontraktile Substanz hineinragen. Er fand besonders die mittleren Strecken der Muskelfasern mit Reihen von trichterförmigen Fortsätzen, hohen und

1) 1864, p. 100. — 2) 1864, p. 100. — 3) 1864, p. 100. — 4) 1859, p. 571.

niedrigen Hügeln besetzt, deren Gipfel immer dem Eintritte eines Nervenästchens entsprach. Die letzteren schienen stets nur einen Achsencylinder zu enthalten, meist teilten sie sich unter dem Gipfel des Nervenhügels in zwei stark divergierende Aeste[1]). Diese hypolemmale Zweiteilung im DOYÈREschen Hügel beobachteten auch ROUGET, THANHOFFER, CIACCIO, BIEDERMANN, AGGAZZOTTI bei verschiedenen Arthropoden, bei deren von mir untersuchten Vertretern sie sich ebenfalls häufig finden läßt.

KÜHNE konnte es weiter außer Zweifel setzen, daß die Konturen des Sarkolemms, die sich zu dem Trichter erheben oder über den Trichter hinziehen, kontinuierlich in die Nervenscheide fortlaufen. Die Verneinung dieser Ansicht oder vielmehr zweifellosen Tatsache, wie sie seinerzeit KÖLLIKER, BEALE, KRAUSE besonders bei Wirbeltieren unternahmen, zu unterstützen, hat SIHLER jenen angeführten schwachen Versuch gemacht. Alle anderen Forscher stimmten der leicht zu bestätigenden Ansicht KÜHNES zu.

Die Entdeckung ROUGETS, daß der DOYÈRESche Hügel noch nicht die wahre Endigung des Nerven ist, hat oben schon ihre Berücksichtigung erfahren.

ARNDT beschreibt den DOYÈREschen Hügel bei Dipteren, Coleopteren, Hymenopteren, Lepidopteren. Seine Beobachtungen erstreckten sich im wesentlichen nur auf den Inhalt desselben, welchen er als lichte, ziemlich homogene, allenfalls etwas körnige, leicht opalisierende, außerordentlich quellungsfähige, krümlig-fädige, körnigfaserige Masse mit Bläschen, Kernen und Kernkörperchen schildert (!). Sein wichtigstes Ergebnis scheint mir, daß der DOYÈRESche Hügel bei verschiedenen Arthropodenklassen sehr verschieden zur Geltung kommt und daß er in zweifelhaften Fällen vielfach durch Ingredienzien noch sichtbar gemacht werden kann[2]). Es beweist das mit der angeführten Quellungsfähigkeit, daß bei der Darstellung des DOYÈREschen Hügels das artefizielle Moment eine gewiße Rolle spielt, eine Ansicht, zu welcher auch meine Beobachtungen führten. Bei den Krebsen erkannte ARNDT richtig als Aequivalent des DOYÈREschen Hügels die ausgedehnte mantelartige Protoplasmaanhäufung um die Muskelfasern, welche „nach Zusatz von manchen Säuren und Alkalien aufquillt und mehr weniger stark gekreppt sich von dem gewöhnlichen Muskelkontur abhebt“ [3]). Auf sonstige ARNDTsche Ergebnisse wurde bereits hingewiesen. Seine Zeichnungen bringen uns noch nicht viel weiter.

---

1) 1871, p. 150. — 2) p. 499. — 3) p. 515.

Wie ARNDT beobachtete FOETTINGER und danach THANHOFFER bei Hydrophilus und anderen Käfern angeblich die Entstehung und Ausbreitung der Kontraktionswellen vom DOYÈREschen Hügel aus. FOETTINGERS Angaben auch über die Nerventeilung daselbst erscheinen indessen wertlos, da Kunstprodukte und Phantasiegebilde ohne genügende Selbstkritik mithineinverwoben sind.

THANHOFFERS „Nervenmantel", wie er die untere Lage der „Nervenplatte" nennt, ist, wie aus seiner Abbildung 4a von einer Nervenendigung aus einem Krebsscherenmuskel hervorgeht, mit jener LEYDIGschen „Matrix" zu identifizieren. „In einem Falle" konnte er bei Hydrophilus beobachten, wie ein Achsencylinder „mit einem Kerne des Nervenmantels zusammenhing" [1]). Auf FOETTINGERS und THANHOFFERS zwischen den Nervenendfasern und der Querstreifung der Muskelfasern aufgestellte Beziehungen werde ich noch zurückkommen.

Aehnlich wie THANHOFFER bildet HUXLEY [2]) die Verbindung eines Nerven mit einem Krebsmuskel ab, doch bezeichnet er jenen kernhaltigen Mantel richtig als eine zwischen Sarkolemm und quergestreifter Muskelsubstanz liegende kernhaltige Protoplasmaschicht [3]); auch erkennt er die sogenannte motorische Endplatte als einen kleinen Wulst in jener Schicht unter dem Sarkolemm, in welches hier die Nervenscheide übergeht.

BREMER erklärt zwar, daß er bezüglich der Terminalachsencylinder im Nervenhügel von Hydrophilus zu keinem definitiven Resultate gekommen ist, doch bildet er eine netzartige Endverzweigung ab, wie ich sie mit Methylenblau nie gesehen habe.

Die Arbeiten von ROSSI, CIACCIO, AGGAZZOTTI und MAZZONI wurden bereits oben erwähnt. Der letztere sah die letzten Nervenendigungen bei Oedipoda auf der Oberfläche der kontraktilen Substanz, vielfach auch auf den „nuclei della fibra muscolare".

RAMÓN Y CAJAL konnte an den Flügelmuskeln von Musca und Hydrophilus keine DOYÈREschen Hügel finden. Die Endfasern seiner Nervennetze durchbohren das Sarkolemm.

Für die Crustaceen fand RETZIUS [4]), daß die letzten Nervenästchen die Muskelfaser eng umspinnen und an ihr endigen.

MONTI beobachtete hypolemmale freie Endigungen in den Bein- und Flugmuskeln der Orthopteren, Endplatten mit Fibrillenverzweigungen bei Käferlarven, an deren Thoraxmuskeln jedoch wie bei Hydrophilus ein Nervennetz, bei Schmetterlingslarven DOYÈREsche

1) p. 31. — 2) p. 77. — 3) p. 153. — 4) 1890, p. 49.

Hügel, bei deren Imago Fibrillenverzweigungen mit Endknöpfchen, bei Hymenopteren wieder Nervenplatten.

Auf SIHLERS Ergebnisse und Abbildungen, welche den Reiz der Neuheit leider mit einem entsprechenden Mangel an Wahrscheinlichkeit erkaufen, näher einzugehen, würde hier viel zu weit führen, und da er fast ausschließlich Froschmuskeln untersucht hat, in dieser Arbeit auch nicht am Platze sein. Die einzige von einem Wirbellosen, nämlich einer Heuschrecke, gewonnene Abbildung einer Muskelinnervation beweist im Vergleich mit den Methylenblaubildern zur Genüge, daß SIHLER uns in der Nervmuskelfrage nicht weiterbringt.

Mit der Methylenblaumethode kann man es bei Astacus, Hydrophilus, Dytiscus, Decticus, Cossus (Raupe) leicht zur Darstellung bringen, wie beim Herantreten der marklosen Nerven an die Muskelfasern die äußere Kontur der Nervenscheide kontinuierlich in die äußere Kontur des Sarkolemms übergeht, wie der oder die Achsencylinder unter der eigentlichen Sarkolemmembran innerhalb jener in fixierten Präparaten oft fibrillär oder körnig erscheinenden, bei Astacus deutlich kernhaltigen Umhüllungsschicht einmal oder noch mehrmals sich dichotomisch teilen und mit ihren letzten nachweisbaren Fasern der Oberfläche der quergestreiften Substanz der Muskelfasern meist in deren Längsrichtung aufliegen. Damit ist zugleich gesagt, daß der DOYÈREsche Hügel tatsächlich noch nicht die motorische Nervenendigung vorstellt oder enthält. Natürlich muß es bei dem Uebergange des Neurilemms in das Sarkolemm zu einer konischen Ausbreitung des ersteren kommen, welche, im Profil gesehen, als Hügel erscheint. Doch kommt dem sogenannten DOYÈREschen oder Nervenendhügel für die Reizübertragung vom Nerven auf die Muskelfaser wohl keine physiologische Bedeutung zu, da er eben nur die grobe anatomische Verbindung beider Organe darstellt. Sein Inhalt unterscheidet sich beim Krebs nicht von der übrigen Masse jener „Matrix" LEYDIGS. Bei anderen Tieren, deren Sarkolemm enger der kontraktilen Substanz anliegt, kann es wohl in dem durch die trichterartige Ausbreitung des Neurilemms beim Uebergange auf das Sarkolemm entstehenden Hohlkegel zu einer Ansammlung von Sarkoplasma oder Matrixsubstanz mit Kernen kommen, doch scheint mir diese Füllungsmasse zu den eintretenden Achsencylindern in keinerlei Beziehung zu stehen. Je nach der mehr oder minder ausgesprochenen Profillage des Präparates wird sich natürlich der Hügel in stärker oder geringer ausgeprägter Deutlichkeit zeigen,

so daß er auf vielen Abbildungen gar nicht zur Geltung kommt. Durch mechanische Insulte, wie Zerrung des Nerven, kann die Hügelbildung offenbar bedeutend verstärkt zum Ausdruck kommen, so daß ihr besonderes Hervortreten als Kunstprodukt zu bezeichnen ist. In Taf. 2, Fig. 13 sind die von dem Nervenstämmchen beiderseits abgehenden Achsencylinder durch die während der Färbung und Fixierung erfolgte mechanische Enfernung der 3 Muskelfasern voneinander derartig gezerrt worden, daß die Verbindung der Faser *a* mit ihrer „Endigung" sogar eine völlige Trennung erfahren hat. Bei *b* und *c* ist es durch denselben Vorgang zur Ausbildung von DOYÈRESchen Hügeln gekommen, welche, wie die in sie mithineingezogene quergestreifte Substanz beweist, nicht wohl als präformiert angesehen werden können. In Präparaten von ganzen Muskeln oder Muskelbündeln bekommt man übrigens, auch wenn man die Nervenscheiden bei enger Blende verfolgt, meist keine typischen Nervenhügel am Eintritt in die Muskelfaser zu sehen. Wenn ferner in Betracht gezogen wird, daß die früheren Beobachter in Ermangelung von geeigneten Färbemethoden meist Zupfpräparate herstellten, einige sogar mit dem Perkussionshammer die Dissoziation der Muskelfasern bewerkstelligten, so scheint der Schluß gerechtfertigt, daß, wie den Quellungsvorgängen in den Reagentien [1]), so auch dem mechanischen Moment eine wohl in Betracht zu ziehende Rolle bei der Darstellung des DOYÈREschen Hügels bei Crustaceen und Insekten zukommt. Da weiter nachgewiesenermaßen die Nerven noch gar nicht ihr Ende darin finden, so erweist sich die Bedeutung desselben für die Nervmuskelfrage überhaupt als überschätzt und ziemlich gleichgültig. Die hüllenlose Nervmuskelverbindung bei den Bärtierchen läßt sich nicht ohne weiteres mit der Verbindung der gleichen Organe bei anderen Arthropoden vergleichen.

2. Nervöse Elemente im Innern der kontraktilen Substanz?

Taf. 4, Fig. 23 zeigt deutlich, wie die Nervenfasern auf größere Strecken innerhalb des Sarkolemms verlaufen und Zweige abgeben, welche die kontraktile Substanz von beiden Seiten umspinnen. Von höchster zu tiefster Einstellung des Mikroskopes werden in diesem von Krebsscherenmuskeln gewonnenen wie bei allen von mir untersuchten Präparaten von anderen Arthropodenmuskeln zuerst Nerven, danach die Querstreifung in hoher und tiefer Einstellung und darunter wieder

1) Vergl. ARNDT.

Nerven scharf erkennbar, so daß ich hier besonders betonen möchte, daß ich die hypolemmalen Fibrillenverästelungen stets und ohne Ausnahme nur an der Oberfläche der quergestreiften Substanz finden konnte.

Auch in dem zu Fig. 22 gehörigen Präparate, in welchem die Innervation einer Muskelfaser der Weidenbohrerraupe sehr ausgiebig gelungen war, sind die blau gefärbten Elemente ausschließlich an der Oberfläche der kontraktilen Substanz, also bei höchster und tiefster Einstellung zu finden; daß es sich hier bereits um die hypolemmalen Verzweigungen handelt, dürfte die Stelle *a* der Abbildung beweisen. Nun gelingt aber die Nerventinktion nicht nur auch an der von dem direkten Luftzutritt durch die Dicke der Faser abgeschlossenen Unterseite der letzteren, sondern in zahllosen Fällen auch an Muskelfasern, welche durch darüberliegende unverletzte Lagen anderer Muskelfasern von der Luft getrennt sind. Wenn also innerhalb der quergestreiften Substanz noch nervöse Elemente existieren, so müßte man geradezu krampfhaft einen hochgradigen funktionellen Unterschied dieser Elemente mit den auf der Oberfläche verlaufenden Nervenfasern konstruieren, um die absolute Indifferenz der ersteren gegenüber dem Methylenblau zu erklären. Viel naturgemäßer scheint mir die Annahme, daß im Innern der quergestreiften Substanz keine nervösen Elemente mehr existieren, welche etwa die Muskelprimitivfibrillen einzeln innervierten. Man kann dieselben ja auch sonst physiologisch nicht als notwendiges Postulat aufstellen, andererseits allerdings auch nicht als unmöglich bezeichnen.

Wenn indessen APÁTHY glaubt, in den glatten Muskeln der Darmwand von Pontobdella mit Hilfe der Vorvergoldung die „Neurofibrillen, als Aeste der eindringenden Primitivfibrillen, in der ganzen Dicke der Muskelfaser verfolgt“ [1]) zu haben, so erscheint mir die Richtigkeit dieser Behauptung aus APÁTHYS Abbildung Tafel 32, Fig. 3 und deren genauerer Beschreibung [2]) nicht einwandfrei hervorzugehen, wie z. B. BETHE es acceptiert und mehrfach verwertet [3])[4]), sogar wieder abbildet [3]). Aus APÁTHYS eigener Beschreibung geht hervor, daß er nur das Aestchen *5* innerhalb der kontraktilen Substanz gesehen hat; es teilt sich in der „unteren kontraktilen Wand der Faser“. Von den Teilungsprodukten ist nicht berichtet, daß sie innerhalb der kontraktilen Substanz verlaufen, andere Zweige senken sich wieder in die „Zwischenleisten der unteren Muskelschlauchwand“.

---

1) 1897, p. 696. — 2) Ebenda. — 3) 1903, p. 40. — 4) 1904.

Auf dieses eine winzige, nicht in einem Querschnitt bestätigte, sondern nur in einem Totalpräparate gefundene, als nervös angesprochene Fäserchen hin Theorieen von intramuskulären d. h. innerhalb der kontraktilen Substanz vorhandenen Verästelungen der Primitivfibrillen oder — mit dem älteren Ausdrucke — intravaginalen Muskelnervendigungen aufzubauen, dürfte etwas voreilig sein, zumal bei einer Goldmethode bekanntlich oft nicht garantiert werden kann für die wirklich nervöse Natur eines so minimalen Strukturelementes. APÁTHY sah ferner oft die dünnsten Neurofibrillen aus der Muskelzelle wieder austreten und noch in eine andere, benachbarte oder entferntere Muskelzelle eintreten[1]). Daraus schließt er auf die Existenz eines geschlossenen „intermuskulären Elementargitters" aus den feinsten Neurofibrillen.

Die oben erwähnte APÁTHYsche Zeichnung der Darmmuskelinnervation von Pontobdella, ein Typus, auf welchen er übrigens „auch die Innervierung der quergestreiften Muskeln der Wirbeltiere leicht und ungezwungen" zurückzuführen beabsichtigt[2]), erinnert lebhaft an die GERLACHschen „intravaginalen Nervennetze" und ähnelt im Prinzipe auffallend der Fig. 12 aus GERLACHS Arbeit[3]), welche ein ebenfalls mit Vergoldung und Differenzierung hergestelltes Präparat vom Frosche darstellt.

Ein weiteres Eingehen auf die von nur wenigen acceptierte, von GERLACH selbst auch durch Methylenblaupräparate angeblich bestätigte Theorie[4]) vom Zusammenhang eines „intravaginalen Nervenplexus" mit einer den ganzen Muskelfaden durchziehenden Granularformation, „Sprenkelung", glaube ich um so mehr hier unterlassen zu dürfen, da all seine Behauptungen, die sich übrigens nur auf die Wirbeltiere erstrecken, bereits zur Genüge von EWALD, BIEDERMANN[5]), THANHOFFER, KÜHNE[6]), DOGIEL[7]) und anderen mit überzeugender Sicherheit auf Kunstprodukte zurückgeführt wurden.

Für die Arthropoden kann man jedenfalls mit Bestimmtheit behaupten, daß sich mit der Methylenblaumethode, welche sich hier bisher als die vollkommenste Nervendarstellungsmethode erwiesen hat, von nervösen Elementen im Innern der quergestreiften Substanz keine Spur nachweisen läßt. Auch die innerhalb des Sarkolemms den kontraktilen Inhalt der Muskelfaser umspinnenden Fibrillen bilden keine eigentlichen Netze, wie es mir überhaupt nicht

1) 1897, p. 695, 693. — 2) 1897, p. 686. — 3) 1874. — 4) 1889, p. 128. — 5) 1876 und 1887. — 6) 1886. — 7) 1890.

ein einziges Mal gelungen ist, im Bereiche der quergestreiften Skelettmuskeln der Arthropoden eine einwandfreie oder auch nur mit einiger Sicherheit als solche anzusprechende nervöse Anastomose aufzufinden.

Ebensowenig besteht eine nachweisbare direkte

3. Beziehung der Nervenendfasern zur Querstreifung der innervierten Muskelfasern. Wir sahen schon oben, daß KOLOMAN BALOGH eine Beziehung der Nervenendigungen zur anisotropen Substanz zu finden glaubte, und daß FOETTINGER und THANHOFFER die Teilungsprodukte der Achsencylinder in die Zwischenscheiben hinein verlaufen ließen. Diese Befunde sind schon mehrfach, so von BIEDERMANN und ROLLETT, als Kunstprodukte nachgewiesen worden, auch hat KÜHNE [1]) bei der Beurteilung der Ergebnisse GERLACHS und FOETTINGERS betont, daß das Nichtübergehen der Erregung vom Muskel auf den Nerven einen gewichtigen theoretischen Grund gegen die Annahme einer Kontinuität zwischen Nerv und Muskel darstellt. Auch CIACCIO sah die Fasern des Achsencylinders im DOYÈREschen Hügel auf die AMICIschen Zwischenscheiben zulaufen, ist indessen vorsichtig genug, nicht bestimmt zu behaupten, daß die Fibrillen sich in dieselben fortsetzten.

An ungefärbt in Alkohol oder Osmiumsäure fixierten Käfermuskeln kann man allerdings leicht die FOETTINGERschen Befunde bestätigen, wenn man sich nicht weiter darüber zu orientieren sucht, ob nicht vielleicht Bindegewebe oder Faltungen im Sarkolemm oder der Muskelsubstanz anstatt nervöser Elemente vorliegen. Ich habe des öfteren Stellen gefunden, an welchen von dem vermeintlichen Nervenhügel aus deutlich zarte Streifen in die Querstreifen der Muskelfasern hineinliefen. Mit Hilfe des Polarisationsmikroskopes ließ sich indessen jedesmal leicht feststellen, daß hier eine partielle Abhebung von Muskelsubstanz infolge Faltenbildung in der Längsrichtung stattgefunden hatte. Die abwechselnd doppelt und einfach brechenden Muskelquerstreifen ließen sich deutlich in den „Nervenhügel" verfolgen.

So werden wir diese anscheinend recht bequeme Lösung der Nervmuskelfrage wie manche andere endgültig zu dem übrigen legen müssen, was in unserer Wissenschaft nur noch historisches Interesse beanspruchen kann.

Bei der Untersuchung der Methylenblaupräparate kann über die Beziehung der Nervenendästchen zur Querstreifung gar kein anderer

1) 1886, p. 335.

Gedanke aufkommen, als daß die ersteren außerhalb der äußeren Oberfläche der letzteren liegen ohne intimere Verbindung. Die Abbildungen 9, 14, 16, 19 mögen das besser als Worte beweisen. Auch die Zahl der Querstreifen, über welche die Nervenendigung sich ausbreitet, und welche von früheren Beobachtern mit in Betracht gezogen wurde, läßt nichts Gesetzmäßiges erkennen, wie Fig. 6 und 13 zeigen, bei deren ersterer die „Nervenendigung" sich über 40 Querstreifen verbreitet.

4. Der Typus der eigentlichen Nervenendigung läßt sich für die Muskeln der Arthropoden nicht im allgemeinen aufstellen, wie ja schon Rina Montis Beobachtungen ergaben. Ihn im einzelnen festzustellen, wird bei unserer wie bei jeder Färbemethode dadurch erschwert, daß man nicht immer vollkommen sicher ist, ob die Färbung der betreffenden Elemente auch ganz vollständig ist und ob man wirklich schon die Endigung vor sich hat, bei einzelnen Klassen der Arthropoden noch dadurch, daß in ihnen offenbar mehrere Typen vorkommen.

Bei Astacus wird man es als Regel ansehen müssen, daß die beiden in derselben Nervenscheide an die Muskelfaser herantretenden Primitivfibrillen sich innerhalb des Sarkolemms noch mehrfach teilen, und daß ihre letzten Zweige, welche die kontraktile Substanz umspinnen, auf der Oberfläche derselben frei endigen. Die Beziehung der beiden letzten Zwillingsäste zueinander ließ sich nur schwer beobachten, doch scheinen sie schließlich, ohne etwa zu verschmelzen oder zu anastomosieren, ihre eigenen Wege zu gehen. Die ersten Teilungsprodukte innerhalb des Sarkolemms pflegen, wenn der Nerv ungefähr im rechten Winkel an die Muskelfaser herantritt, in einander entgegengesetzter Richtung zu verlaufen.

Dieselbe Beobachtung wiederholt sich sehr häufig bei Hydrophilus, bei welchem diese Endgabeln jedoch bereits die wahren Endigungen darzustellen scheinen, da beide Aestchen meist annähernd gleiche Länge und Struktur aufweisen und frei oder in varikositätenartige Knötchen ausgehen. Fig. 13 zeigt bei *b* diesen Typus, der auch in Fig. 6 und 15 wiederkehrt. Daß hier jedoch auch andere Endigungsformen vorkommen, zeigt z. B. Fig. 14, in welcher der Endstern anscheinend polytomisch aus dem größeren Knötchen gebildet ist, wenn in letzterem nicht nur eine artefizielle Knäuelbildung vorliegt.

Bei Dytiscus ließ sich keine gesetzmäßige Gestalt der letzten freien Endigungen bestimmen. Sie verlaufen, wie Fig. 24 zeigt, vor-

wiegend längs des quergestreiften Faserinhaltes, um sich schließlich in unregelmäßiger Bahn auf dessen Oberfläche zu verteilen, wie aus Fig. 18 und 19 hervorgeht. Auf der ersteren sind auch wieder zwei polytomische Verzweigungen dargestellt.

Die Endgabeln treten wieder mehr typisch bei Decticus als letzte Zweigspitzen der Nervenbäumchen hervor, wie Fig. 11 und 4 an einigen Stellen, und 2 unten erkennen lassen. Im Präparate der Fig. 1 trennen sich die äußersten Aestchen meist nicht in entgegengesetzter Richtung. Auf Taf. 1, Fig. 8 und 9 sind wieder feine knotige Nervenfasern innerhalb des Sarkolemms zu verfolgen.

Sehr verschieden ist das Verhalten bei den Raupen. Fig. 22 und 25 stammen von demselben Individuum, einer Weidenbohrerraupe. Während fast in der gesamten Muskulatur derselben die Seitenäste der zarten Nerven in ovale oder runde Endplatten von typischer Bildung auslaufen — vergl. Fig. 25 —, sind, wie die oben schon beschriebene Fig. 22 zeigt, manche größeren Muskelfasern von reichverzweigten Zwillingsnervenfasern innerviert. Die isolierten blau gefärbten Punkte, Tropfen und Knötchen sind jedenfalls sogenannte Varikositäten, zwischen welchen die Fäserchen auseinandergerissen sind. Daß wir auch bei den übrigen oben beschriebenen Arthropoden die doppelte Nervenversorgung der einzelnen Muskelfasern als Regel annehmen müssen, geht aus dem früher Gesagten hervor.

Sehr bemerkenswert erscheint es, daß gerade in den höchstdifferenzierten Muskeln, wie wir sie bei den Insekten antreffen, fast ausnahmslos besondere Nervenendorgane, Endgeweihe, Endplatten oder dergleichen fehlen, und daß wir vielmehr weitaus vorwiegend die von Rollett als die einfachsten bezeichneten Nervenendigungen vorfinden, nämlich eine „Terminalfaser, die sich dem Muskelfaserinhalte der Länge nach anlegt".

IV. Die Varikositäten

sind bekanntlich jene eigenartigen Anschwellungen im Verlaufe der Nervenfasern, wie sie besonders in Methylenblaupräparaten oft in erstaunlicher Anzahl und verschiedener Gestalt zu beobachten sind. Auch ich habe sie in den meisten meiner Präparate angetroffen, wie auch aus mehreren der Zeichnungen hervorgeht; bisher habe ich indessen absichtlich ihre Erwähnung fast völlig vermieden, um mir eine Zusammenfassung der bezüglich dieser noch nicht ganz einheitlich gedeuteten Gebilde existierenden Erfahrungen und Anschauungen vorzubehalten.

Im allgemeinen sind die Autoren darüber einig, daß die sogenannten Varikositäten keine normalen Strukturelemente des lebenden Nerven darstellen; von den meisten werden sie als Kunstprodukte, d. h. durch die chemische Einwirkung der bei den verschiedenen Färbungsmethoden angewendeten Reagentien entstandene Veränderungen der zarten Nervensubstanz, angesehen. Nach APÁTHY können sie auf zwei Wegen entstehen [1]), entweder durch unregelmäßige Quellungen und Schrumpfungen der Inter- bezw. Perifibrillärsubstanz, oder durch lokales Auseinanderweichen der in der Primitivfibrille vereinigten Elementarfibrillen. MAX SCHULTZE wußte schon im Jahre 1871 [2]), daß die „Varikositäten" der „Nervenprimitivfibrillen" durch „partielles Aufquellen" zu stande kommen, welches durch „wässerige Lösungen verschiedener Salze und der Chromsäure oder Ueberosmiumsäure bestimmter Konzentrationen" bewirkt wird, „bis unter dieser Quellung die Faser unkenntlich wird". Er bildet variköse Primitivfibrillen ab [3]). Uebrigens hat bereits REMAK [4]) variköse Nervenfasern genau beschrieben und abgebildet; er fand sie im Froschischiadicus und den Cerebrospinalnerven junger Kaninchen und schrieb ihnen eine gewisse entwickelungsgeschichtliche Bedeutung zu im Gegensatz zu TREVIRANUS [5]), welcher sie in der Corticalis des Gehirns beobachtete.

Auch HAECKEL [6]) spricht von „eigentümlich variköser Gerinnung des Inhaltes" der Röhren des sympathischen Nervensystems. ARNSTEIN [7]) gegenüber, welcher die mit Osmium, Chlorgold und Methylenblau erhaltenen Varikositäten als präformiert ansah, macht BIEDERMANN [8]) geltend, daß auch die an gebläuten Nerven frischer, noch erregbarer Muskeln zu beobachtenden perlschnurartig aneinander gereihten knotigen Verdickungen durch „die mit der Färbung notwendig verbundenen chemischen Veränderungen" erklärt werden können und „immer wenigstens als ein Zeichen beginnenden Absterbens aufzufassen" sind.

Gewiß würde es auch gelingen, Krebsscherenmuskeln, an deren Nerven man bereits die Varikositäten konstatiert hat, noch vom Nervenstamm aus erfolgreich zu reizen; doch würde dieser Versuch nicht einwandfrei beweisen, daß die varikösen Fasern noch erregbar und leitungsfähig sind, da der Erfolg auch durch ungefärbt gebliebene und daher nicht zur Beobachtung gelangte, chemisch nicht veränderte Fasern bedingt sein könnte.

---

1) 1897, p. 519. — 2) STRICKERS Handbuch. — 3) p. 109. — 4) 1836, p. 145 ff. — 5) Siehe REMAK, p. 156. — 6) 1857, p. 538. — 7) 1887, p. 125. — 8) 1887, p. 21.

Von entscheidender Bedeutung sind die Untersuchungen von ALLEN, welcher an ungefärbten und an Methylenblaupräparaten die Entstehung der Perlschnurformationen durch Zusammenfließen der Fasersubstanz aus den sich entsprechend verdünnenden Nachbarstellen direkt beobachtete. BETHE [1]) konnte dies bestätigen. Die dünnen Verbindungsfasern können schließlich reißen, so daß man nur noch eine Reihe blauer Kugeln vor sich hat. Auf derartige Vorgänge sind jedenfalls auch die zwischen den Endvarikositäten entstandenen Kontinuitätstrennungen in meinen Figg. 8, 9, 13, 22, 25 zurückzuführen.

Einen ferneren wichtigen Beweis für die artefizielle Natur der in Rede stehenden Erscheinungen haben APÁTHY [2]) und WOLFF [3]) dadurch geliefert, daß sie gleichartige Untersuchungsobjekte, welche nach Färbung mit stärkeren Methylenblaulösungen zahlreiche Varikositäten zeigten, mit verdünnteren Lösungen von jenen frei erhielten. APÁTHY [4]) hebt hervor, daß bei langsamen Methoden Varikositäten ausbleiben. In gleichem Sinne äußert sich OWSIANNIKOW [5]), welcher übrigens eine Bewegungsfähigkeit der Dendriten und Endausbreitungen annehmen zu müssen glaubte [6]).

Die gleichen kugeligen oder spindelförmigen Gerinnungströpfchen zeigen bekanntlich die Pseudopodien mancher Rhizopoden, z. B. Actinosphaerium, Amphistegina, bei ihrer Kontraktion auf chemische Reize hin, eine Analogie, welche einige Forscher verleitete, den Protoplasmafortsätzen der Ganglienzellen eine amöboide Bewegungsfähigkeit zuzuschreiben und eine „Plastizität der Neurone“ aufzustellen, nachdem sie mit GOLGI derartige Perlschnüre dargestellt hatten (s. VERWORN, Allgem. Physiol., p. 403).

Wenn wir uns übrigens von SIHLERS Ansichten überzeugen lassen könnten, so würden wir sämtliche Methylenblau- und sonstigen Varikositäten als „Kontaktstellen“ auffassen, da nach SIHLERS Angabe seine Hämatoxylinmethode „den Anspruch erheben darf, die richtige Deutung der varikösen Endfasern nachgewiesen und das richtige Verständnis für das, was wirklich Nervenendigungen (resp. Kontaktstellen) sind, angebahnt zu haben“ [7]).

Von RINA MONTI sind mit der Methylenblaumethode bei Lepidopteren kleine Knöpfchen (piccolo bottoncino) als Endigungen motorischer Nervenfasern beschrieben worden [8]). Vermutlich handelt

---

1) 1898, p. 389. — 2) 1897, p. 519. — 3) 1902, p. 175. — 4) Encyklop., p. 695. — 5) 1900, p. 14. — 6) p. 16, 21. — 7) p. 341. — 8) p. 8.

es sich dabei ebenfalls um Varikositäten. Bis vollkommenere Methoden uns etwa eines besseren belehren, dürfte jedenfalls für die Innervation der quergestreiften Skelettmuskeln der bisher untersuchten Arthropoden im allgemeinen streng daran festzuhalten sein, daß sich die Primitivfibrillen, welche den letzten Nervenverzweigungen unter dem Sarkolemm entstammen, mit freien Enden im Sarkoplasma der quergestreiften kontraktilen Substanz anlegen und so per contiguitatem den Reiz übertragen, während besondere Endorgane fehlen und auch die „Varikositäten" keinerlei derartige Bedeutung haben.

V. Die Doppelinnervation.

In der vorliegenden Arbeit wurde aufs neue die doppelte Innervation der Muskelfasern des Oeffners der Krebsschere nachgewiesen und als Typus aufgestellt. Die beiden, gemeinsam aus einer Nervenscheide unter das Sarkolemm einer Muskelfaser tretenden und sich hier an die kontraktile Substanz verzweigenden Achsencylinder wurden nebeneinander durch alle Verzweigungen höherer Ordnung weiterverfolgt bis in die beiden Hauptachsencylinder des an den Muskel herantretenden Nerven, und es kann weiter unter Hinzuziehung älterer Erfahrungen (Haeckel) ihr getrennter Ursprung aus einem Bauchganglion als feststehend betrachtet werden. Des ferneren wurden die gleichen oder, betreffs der Anzahl der gleichzeitig von einem Achsencylinder höherer Ordnung abzweigenden Aeste, etwas verschiedene Verhältnisse für sämtliche übrigen Skelettmuskeln von Astacus fluviatilis und die Thoraxmuskeln von Hydrophilus piceus bestätigt gefunden. Derselbe Befund der Doppelinnervation wurde weiter für die Beinmuskeln von Hydrophilus, für sämtliche, auch die Flügelmuskeln von Dytiscus marginalis, für die Thorax- und Sprungbeinmuskeln von Decticus und endlich die Körpermuskulatur der Raupen erhoben. Ein übereinstimmendes Bild fanden wir bereits dargestellt von einer anderen Heuschreckenart, Oedipoda fasciata (Mazzoni), und einem anderen Crustaceen, Palaemon (Retzius). Wir glaubten daraufhin die Innervation der Muskelfasern durch zwei Nervenelemente getrennten Ursprungs für die Arthropoden als Regel aufstellen zu können.

In dem Scherenöffner von Astacus wie den Thorax- und Beinmuskeln von Decticus konnten bei der Uebersichtlichkeit des ganzen Innervationsgebietes alle einzelnen Doppelnerven zusammengenommen

auf einen einzigen Hauptdoppelstamm, der erste Ursprung von allen aus dem Zentralorgan also auf ein Paar getrennter Wurzeln zurückgeführt werden.

Höchst wahrscheinlich gilt dies auch für alle anderen doppelt innervierten Arthropodenmuskeln, da jene diplotomische Verzweigung ja als zufällig und bedeutungslos erscheinen würde, wenn nicht von der ersten bis zur letzten Teilung die zweifache Natur des Nerven gewahrt bliebe.

Fragen wir uns nun nach der physiologischen Bedeutung dieser jedenfalls äußerst eigenartigen und sonst noch nirgends aufgefundenen Innervierung, so kommen wir leider einstweilen noch zu keiner befriedigenden Beantwortung dieser Frage, wenn wir zwecklose Hypothesen in Anbetracht der so schon bestehenden Ueberproduktion in diesem Artikel vermeiden wollen. Zunächst bedarf es weiterer, umfangreicher, vergleichender Forschung, um zu entscheiden, ob diese Doppelinnervation im Gebiete der Muskeln der Gliederfüßer ihre Domäne besitzt oder auch bei anderen Tierklassen vorkommt und sich vielleicht ein phylogenetischer Zusammenhang dieser Erscheinungen nachweisen läßt. Auch ein ontogenetisches Studium des Gegenstandes scheint mir reichlich Interesse zu bieten, besonders bei den merkwürdigen Veränderungen der Insekten. Bei dem Aufsuchen ähnlicher anatomischer Befunde bei anderen Tierklassen wird es sehr auf die glückliche Wahl geeigneter Untersuchungsobjekte ankommen. Die ganze bisherige Untersuchung ging bekanntlich von den antagonistischen Krebsscherenmuskeln aus, deren eigentümliche Innervation Biedermann eingehend untersucht hatte. Piotrowski hat diese Versuche wiederholt. Biedermann kam zu den oben (p. 6/7) bereits erwähnten Ergebnissen, welche er im gleichen Sinne wie die Pawlowschen Beobachtungen an den Schließmuskeln von Anodonta zu deuten geneigt ist[1]). „Es würde sich dann in beiden Fällen um gemischte Nerven handeln, welche teils Fasern enthalten, deren Erregung zu einer Kontraktion der zugehörigen Muskelelemente führt, wenn dieselben sich im Ruhezustande befinden, teils solche, durch deren Erregung ein gegenseitiger Erfolg, d. i. Hemmung, bezw. Erschlaffung kontrahierter Fasern bewirkt wird." „Die Annahme von zwei verschiedenen antagonistisch wirkenden Fasergattungen, welche in einem und demselben Nervenstamm vereinigt einen quergestreiften Muskel versorgen, der ähnlich wie zahlreiche glatte Muskeln, sowie auch der Herzmuskel in hohem Grade zu einer vom

1) 1887, p. 8.

Zentralnervensystem unabhängigen tonischen Erregung neigt, würde nach den Erfahrungen, über welche man gegenwärtig bezüglich der Verbreitung von Hemmungsnerven verfügt, keine allzu gewagte sein, selbst wenn man sich nicht auf den von GASKELL neuerdings vertretenen Standpunkt stellt, welcher für alle innervierten Gewebe das Vorhandensein zweier antagonistisch wirkender — ‚anabolischer' und ‚katabolischer' — Faserklassen annimmt."

Nun hat sich diese Annahme einer doppelten Nervenversorgung für die Scherenmuskeln zwar bestätigt, und man könnte leicht geneigt sein, darin das anatomische Substrat jener auffallenden physiologischen Verhältnisse zu erblicken, doch gibt der Umstand hier wieder zu denken, daß sich die gleichen histologischen Ergebnisse noch an so vielen anderen, a priori als physiologisch sehr verschieden anzusehenden Muskeln, wie denen der Schwimmkäferflügel und Beine, der Sprungbeine der Heuschrecken und der sich nach Art der Würmer bewegenden Raupen, erhalten ließen. Auch hier müßten zunächst umfangreiche experimentelle Untersuchungen einsetzen.

Eine interessante Doppelinnervation gibt übrigens FLETCHER an. Er stellte in dem Musculus retractor penis des Igels mit Methylenblau eine oberflächliche Plexusformation dar, von welcher ein intercellulares Netzwerk ausgeht und die motorische Nervenendigung bildet. Besondere Endorgane oder freie Endigungen fehlten völlig. In den Anastomosen dieses Netzwerkes treffen sich nun die Endfasern der beiden den Muskel versorgenden Nerven, des Pudicus und Erigens, deren tatsächlichen Zusammenhang FLETCHER durch Degenerationsversuche sichergestellt zu haben glaubt: nach Durchschneidung beider Nerven stellte sich prompt die Degeneration des Endnetzes ein, sie blieb jedoch völlig aus, wenn nur einer der Nerven durchschnitten wurde, da seine Elemente durch jene Anastomosen mit dem anderen Nerven in trophischem Zusammenhange blieben.

Es wird noch mancher neuen Analogie bedürfen, bis die Lehre von der doppelten Innervation durch erregende, dissimilierende (LÖWIT), katabolische und hemmende, assimilierende, anabolische Fasern auf breiterer Basis begründet werden kann.

VI. Der Innervationsvorgang.

Ueberblicken wir noch einmal die gewonnenen Ergebnisse, um uns darüber klar zu werden, was sich daraus zur Beantwortung einer der wichtigsten Fragen der allgemeinen Nervmuskelphysiologie,

der Frage nach der Art des Vorganges bei der Uebertragung der Erregung von der Nervendigung auf die Muskelfaser, lernen läßt.

Zunächst muß, wie wir sehen, streng daran festgehalten werden, daß eine Kontinuität zwischen den in Rede stehenden nervösen und muskulären, speziell kontraktilen, Elementen (Fibrillen) nicht nachzuweisen ist. Wir werden es um so eher endgültig aufgeben können, aufs neue nach einem derartigen Zusammenhange zu suchen, als ja feststeht, daß auch die Uebertragung der Erregung von Ganglienzellen auf Nervenfasern und umgekehrt vielfach nicht per continuitatem, sondern nur durch Berührung erfolgt [1]).

Als derjenige Ort, an welchem diese Kontiguität zunächst stattfindet, darf wohl gegenwärtig das Sarkoplasma angesehen werden, da unseres Erachtens innerhalb der kontraktilen Fibrillen nervöse Elemente noch nicht einwandfrei dargestellt, theoretisch auch kaum zu erwarten sind. Die Möglichkeit ihrer Existenz kann andererseits natürlich nicht vollkommen abgestritten werden.

Von den Muskelfasern, welche ein Sarkolemm besitzen, mag noch besonders hervorgehoben werden, daß ihre motorischen Nervenendigungen hypolemmal gelegen sind. Wo die quergestreifte Substanz innerhalb des Sarkolemms noch von einem protoplasmatischen Mantel umhüllt wird, verlaufen die Nervenendfasern demnach in dem letzteren. Ob sie indessen den fibrillären Inhalt der Muskelfaser wirklich erreichen und berühren, muß als zweifelhaft gelten. Falls wirklich eine Berührung stattfindet, entsteht die Frage, ob die Nerven die quergestreifte Substanz nur mit ihren Endpunkten oder streckenweise berühren und so mehrere „Kontaktstellen" bilden. Im allgemeinen ist für eine so gut wie gleichzeitig an mehreren Stellen erfolgende Innervation der einzelnen Muskelfasern, besonders bei den am höchsten differenzierten der Arthropoden, durch die Verästelung der einen oder mehreren zur gleichen Faser tretenden Primitivfibrillen die Bedingung gegeben.

Bei derartig reich innervierten Muskeln ist das Auftreten eines Gesamtstromes als resultierend aus einzelnen phasischen Aktionsströmen nicht wohl denkbar, da ein Aequator im Sinne von Hermann nicht angenommen werden kann, weil immer unzählige, im ganzen Muskel verteilte Stellen gleichzeitig negativ werden müssen.

Dem als Endorgan bei Arthropoden beschriebenen Doyèreschen Hügel ist mit größter Wahrscheinlichkeit keine Bedeutung für den Innervationsvorgang beizumessen, da er teils artefizieller Natur, teils

---

1) Biedermann, Elektrophysiol., 1895, p. 485.

seinem Inhalt nach jenem Protoplasmamantel zuzurechnen ist und endlich meist noch gar nicht die Nervenendfasern enthält.

Die Gestalt der letzteren läßt sich noch weniger als bei den Wirbeltieren in ein Schema zwängen, wie das zur Aufstellung der elektrischen Innervationshypothesen geschehen mußte. Du Bois-Reymond hatte bekanntlich in seiner ersten „Entladungshypothese" die Endplatte als allgemein zutreffendes Schema der motorischen Nervenendigung angenommen; durch die Erregung sollten die beiden Flächen dieser „elektrischen Platte" entgegengesetzt elektrisch werden, und die Ausgleichung dieser Spannungsdifferenz sollte als elektrischer Schlag die Muskelfaser erregen. Als sich dann nur bei wenigen Tierklassen motorische Endplatten histologisch nachweisen ließen, stellte Du Bois-Reymond in einer „modifizierten Entladungshypothese" eine hakenförmige Umbiegung der Nervenendfasern als Prinzip auf; ihre Endfläche sollte negativ gegen ihren Verlauf sein und negative Schwankungen eines hierdurch bestehenden Ruhestromes den elektrischen Reiz auf die kontraktile Substanz ausüben. Kühne [1]) wies darauf hin, daß derartige umgebogene Enden von Achsencylindern noch von niemandem beobachtet seien und suchte zunächst durch ausgedehnte histologische Untersuchungen auf diesem ihm längst heimischen Gebiete die Grundlagen einer Innervationstheorie zu erweitern. So konnte er den „Endplatten in Nervenhügeln" seine Befunde beim Frosch und Salamander gegenüberstellen: „es giebt motorische Nervendigungen, welche bloß aus markfreien und kernlosen, direkt und ohne jedes Zwischenglied zwischen Sarkolemm und kontraktilem Gewebe gebetteten Endfasern bestehen. Wir werden also den eigentlichen Innervationsapparat nur in diesem Teile der Nervenendigung zu suchen haben und müssen uns fragen, von welcher Gestalt, von welchem Baue und von welcher Struktur er sei" [2]). Auch Kühne sucht nun die von ihm beobachteten Anordnungen der Endfasern, „Plattengeweihe und Stangengeweihe," auf schematische, „das ganze Gesetz der motorischen Nervenendigung" enthaltende Figuren zu reduzieren, und findet, daß es bei den Amphibien kein hypolemmales Nervengeäst ohne Parallelfasern gebe. Da auch er der Meinung ist, daß, wenn die Wirkung des Nerven auf den Muskel eine elektrische ist, dies nur in der Anordnung der Endfasern zueinander und zur Muskelsubstanz liegen kann, und daß es andererseits darauf ankomme, daß die „Verästelungsweise Ablauf der Schwankungswellen in den nächstbenachbarten Zweigen mit Phasendifferenz bewirke" [3]), so sieht

1) Kühne 1879, p. 104. — 2) Kühne 1879, p. 122. — 3) p. 133.

er alle Bedingungen für eine elektrische Hypothese gegeben, die er mit größter Konsequenz durchzuführen sucht. Selbst die „Plattensohle" wird als stark polarisierbarer Leiter zur Ausschließung der übrigen hypolemmalen Aeste von der Wirkung des elektrischen Schlages der Theorie angepaßt.

Daß einer so einfachen und anschaulichen Theorie wie der von KÜHNE begründeten die in vorliegender Arbeit um einige neue vermehrten Befunde bei wirbellosen Tieren jeden Boden entziehen, hat schon BIEDERMANN hervorgehoben. Es erscheint nach den äußerst mannigfaltigen Ergebnissen in den verschiedensten Tierklassen kaum möglich, ein so einfaches Schema zu konstruieren, auf welchem eine physikalische Erklärung des vom Nerven aus auf den Muskel wirkenden Reizes aufgebaut werden könnte.

Nun drängt sich aber die unverkennbare grundsätzliche Uebereinstimmung der motorischen Nervenendigungen mit denjenigen in den elektrischen Organen immer wieder in den Vordergrund des Interesses. Man wird dieselbe nicht für eine zufällige Konvergenz halten wollen, vielmehr zu der Annahme geneigt sein, in dieser anatomischen Uebereinstimmung den Ausdruck einer physiologischen Analogie zu sehen. Es dürfte daher die Hypothese noch keineswegs von der Hand zu weisen sein, daß doch vielleicht die bei der Erregung in den Nervenendigungen bewirkten chemischen Vorgänge elektrische Spannungsdifferenzen hervorbringen, welche ihrerseits die kontraktilen Elemente reizen; eine Vorstellung, die nicht mehr so unbegründet erscheint, seitdem sich durch GARTENS Befunde die Annahme bestätigte, „daß die Nervenendausbreitung selbst oder ein funktionell innig mit dieser verbundenes Gebilde das elektromotorisch Wirksame im elektrischen Organ des Zitterrochens darstellt".

D. Literaturverzeichnis.

AGGAZZOTTI, A., Sulla terminazione nervosa motrice nei muscoli striati degli insetti. Nota preventiva. Atti della R. Accad. delle Scienze di Torino, Vol. 37, 1902, p. 724.

APÁTHY, S., Das leitende Element des Nervensystems und seine topographischen Beziehungen zu den Zellen. Mitt. d. Zool. Stat. zu Neapel, Bd. 12, 1897.

ARNDT, R., Untersuchungen über die Endigung der Nerven in den quergestreiften Muskelfasern. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 9, 1873, p. 481.

ARNSTEIN, C., Die Methylenblaufärbung als histologische Methode. (Erste Mitteilung.) Anat. Anz., Bd. 2, 1887, p. 125.

— Die Methylenblaufärbung als histologische Methode. (Zweite Mitteilung.) Anat. Anz., Bd. 2, 1887, p. 551.

Balogh Kálmán, Néhány szó az izomidegek végződeséről. Magyar akadémiai értesitő, 1865, p, 153—178.
Bethe, A., Ein Beitrag zur Kenntnis des peripheren Nervensystems von Astacus fluviatilis, 1896. Anat. Anz., Bd. 12, 1896, p. 31.
— Eine neue Methode der Methylenblaufixation. Anat. Anz., Bd. 12, 1896, p. 438.
— Allgemeine Anatomie und Physiologie des Nervensystems, Leipzig 1903.
— Der heutige Stand der Neurontheorie. Dtsch. med. Wochenschr., 1904, No. 33.
Biedermann, W., Zur Lehre vom Bau der quergestreiften Muskelfaser. Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wissensch., Bd. 74, 3. Abt., Juli 1876.
— Ueber die Innervation der Krebsschere. Beitr. zur allgem. Nerven- und Muskelphysiologie. XX. Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wissensch., Bd. 95, 1887, 3. Abt., Jänner-Heft.
— Zur Kenntnis der Nerven und Nervenendigungen in den quergestreiften Muskeln der Wirbellosen. Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wissensch., Bd. 96, 1887, 3. Abt., Juni-Heft.
— Ueber den Ursprung und die Endigungsweise der Nerven in den Ganglien wirbelloser Tiere. Jenaische Zeitschr. für Naturwiss., Bd. 25, N. F. Bd. 18, 1891, p. 429.
— Elektrophysiologie, Jena 1895.
— Elektrophysiologie. Ergebn. d. Physiologie 1903, Abt. II, II.
Bremer, L., Ueber die Endigungen der markhaltigen und marklosen Nerven im quergestreiften Muskel. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 21, 1882, p. 165.
Cájal, S. R., Coloration par la méthode de Golgi de terminaisons des trachées et des nerfs dans les muscles des ailes des Insectes. Zeitschr. f. wissensch. Mikr., Bd. 7, 1890, p. 332.
Ciaccio, G. V., Della notomia minuta di quei muscoli che negli insetti muovono le ali. Memorie della R. Accad. delle Scienze dell' Istituto di Bologna, Ser. 4, Vol. 8, 1887, p. 525.
Dogiel, A., Methylenblautinktion der motorischen Nervenendigungen in den Muskeln der Amphibien und Reptilien. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 35, 1890, p. 305.
— Methylenblau zur Nervenfärbung. In Encyklop. der mikr. Technik mit besonderer Berücksichtigung der Färbelehre, herausgeg. von Ehrlich, Krause, Mosse, Rosin, Weigert, Berlin-Wien, 1903, p. 809.
Donders u. Engelmann, Onderzoekingen gedaan in het phys. Laborat. der Utrechtsche Hoogeschool, Bd.. 5, 1880, Heft 3.
Doyère, M., Mémoire sur les Tardigrades. Annales des Sciences naturelles, Série 2, T. 14, 1840, p. 269.
Ehrenberg, Beobachtung einer bisher unerkannten Struktur des Seelenorgans, Berlin 1836 (Astacus).
Ehrlich, P., Ueber die Methylenblaureaktion der lebenden Nervensubstanz. Dtsch. med. Wochenschr., Bd. 12, 1886, p. 49.
Engelmann, Th. W., Centralbl. f. d. med. Wiss. 1863, No. 19.
— Mikroskopische Untersuchungen über die quergestreifte Muskelsubstanz. Pflügers Arch., Bd. 7, 1873, p. 33.

Engelmann, Th. W., Kontraktilität und Doppelbrechung. Pflügers Arch., Bd. 11, 1875, p. 432.
— (Foettinger), Koninglijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, 28. Juni 1879.
Ewald, Pflügers Arch., Bd. 12, 1876, p. 529.
Fletcher, W. M., Preliminary note on the motor and inhibitor nerve-endings in smooth muscle. Journ. of Physiol., Vol. 22, 1897—98, p. XXXVII.
Foettinger, A., Sur les terminaisons des nerfs dans les muscles des Insectes. Onderz. Phys. Lab. Utrecht, Deel 5, Aufl. 3. VI, p. 293. Dieselbe Arbeit in Arch. de Biol., T. 1, 1880, p. 279.
Friedländer, B., Ueber die markhaltigen Nervenfasern und Neurochorde der Crustaceen und Anneliden. Mitt. a. d. Zool. Station z. Neapel, Bd. 9, 1889, H. 2.
Garten, S., Beiträge zur Physiol. des elektr. Organes der Zitterrochen. Abteil. d. K. Sächs. Ges. d. Wissensch., Bd. 25, math. phys. Kl., 1899.
— Die Veränderungen in den Ganglienzellen des elekt. Lappens des Zitterrochen nach Durchschneid. der Nerven. Arch. f. Anat. und Physiol., Anat. Abt., 1900.
Gaskell, W. H., On the action of muscarin upon the heart, and on the electrical changes in the non-beating cardiac muscle brought about by stimulation of the inhibitory and augmentous nerves. Journ. of Physiol., Vol. 8, 1887, p. 404.
Gerlach, J., Das Verhältnis der Nerven zu den willkürlichen Muskeln der Wirbeltiere, Leipzig 1874.
Gerlach, J. v., Ueber die Einwirkung des Methylenblaus auf die Muskelnerven des lebenden Frosches. Sitz. d. math.-physikal. Klasse vom 5. Mai 1889.
Haeckel, E., De telis quibusdam Astaci fluviatilis. Dissertatio inaug. histologica, die VII. m. Martii a. 1857, Berolini, T. G. Schade.
— Ueber die Gewebe des Flußkrebses. Müllers Arch., 1857, p. 469.
Hannover, Mikroskopiske Undersögelser af Nervesystemet, Kjöbenhavn 1842.
— Recherches microscopiques sur le système nerveux, Copenhague 1844.
Helmholtz, De fabrica systematis nervosi evertebratorum. Diss. inaug. Berol. 1842.
Huxley, T. H., Der Krebs. Eine Einleitung in das Studium der Zoologie, Leipzig 1881.
Kolmer, W., Eine Beobachtung über vitale Färbung bei Corethra plumicornis. (Vorl. Mitteilung.) Biol. Centralbl., Bd. 24, 1904, p. 221.
Krause, W., Ueber die Endigung der Muskelnerven. Zeitschr. f. rationelle Mediz., 3. Reihe, Bd. 18.
Kühne, W., Untersuchungen über Bewegungen und Veränderungen der kontraktilen Substanzen. Müllers Arch., 1859, p. 564.
— Nerv und Muskelfaser. Strickers Handbuch der Lehre v. d. Geweben, Leipzig 1871, Bd. 1, p. 147.
— Ueber das Verhalten des Muskels zum Nerven. Unters. aus d. Physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg, Bd. 3, 1879, Heft 1, 2.

Kühne, W., Ueber das doppelsinnige Leitungsvermögen der Nerven. Zeitschr. f. Biol., Bd. 22, 1886, p. 305.

Leydig, F., Ueber Argulus foliaceus. Zeitschr. für wissensch. Zoologie, Bd. 2, 1850, p. 323.

— Ueber Artemia salina und Branchipus stagnalis. Zeitschr. f. wissensch. Zoologie, Bd. 3, 1851, p. 280.

— Zum feineren Bau der Arthropoden. Müllers Arch., 1855, p. 376.

— Lehrbuch der Histologie des Menschen und der Tiere, 1857.

— Vom Bau des tierischen Körpers. Handbuch der vergl. Anat., Tübingen 1864.

Löwit, M., Beiträge zur Kenntnis der Innervation des Herzens. Vierte Mitteilung. Pflügers Arch., Bd. 29, 1882, p. 469.

Mays, K., Histo-physiologische Untersuchungen über die Verbreitung der Nerven in den Muskeln. Zeitschr. f. Biolog., Bd. 20, 1884, p. 449.

Mazzoni, Composizione anatomica dei nervi e loro modo di terminare nei muscoli delle cavalette (Oedipoda fasciata Siebold). Memorie della R. Accad. delle Scienze dell' Istituto di Bologna, Ser. 4, Vol. 9, 1888.

Monti, R., Ricerche microscopiche sul sistema nervoso degli insetti. (Nota preventiva. Adunanza del 24 marzo 1892, Pavia.) Rendiconti del R. Istituto Lombardo, Ser 2, Vol. 25, 1891, Fasc 7.

— Sul sistema nervoso dei Dendroceli d'acqua dolce. Bolletino scientifico Pavia, 1896, No. 2—3.

Müller, Joh., Ueber ein eigentümliches, dem Nervus sympathicus analoges Nervensystem der Eingeweide bei den Insekten. Mit 3 Kupfertafeln. Nova Acta Phys. Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Curios, T. 14, 1828, P. 1.

Owsiannikow, Ph., Ueber die Nervenelemente und das Nervensystem des Flußkrebses (Astacus fluviatilis). Mém. de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg, Sér. 8, T. 10, 1900, Fasc. 2.

Piotrowsky, G., On the muscle-nerve physiology of the crayfish especially with regard to inhibition. Journ. of Physiol., Vol. 14, 1893, p. 163.

Quatrefages, A. de, Mémoire sur l'Eolidine paradoxale. Annales des Sciences naturelles, Sér. 2, T. 19, 1843, p. 274.

Reichert, K. B., Bericht über die Fortschritte der mikr. Anatomie in dem Jahre 1842. Müllers Arch., 1843, No. I, p. CLXXX.

Remak, R., Vorl. Mitt. mikroskop. Beob. über den inneren Bau der Cerebrospinalnerven und über die Entwickelung ihrer Formelemente. Müllers Arch., 1836, p. 145.

— Observationes anatomicae et microscopicae de systematis nervosi structura. Dissertatio, Berolini 1838.

— Ueber den Inhalt der Nervenprimitivröhren. Müllers Arch., 1843, No. IV, p. 197.

— Müllers Arch., 1844.

Retzius, G., Zur Kenntnis des Nervensystems der Crustaceen. Biolog. Unters., 1890, Neue Folge Bd. 1, H. 1.

Retzius, G., Zur Kenntnis des Nervensytems der Würmer, Amphioxus und Myxine. Biolog. Unters., 1891.
— Zur Kenntnis der motorischen Nervenendigungen. Biolog. Unters., Neue Folge Bd. 3, 1892, p. 41.
Rollett, A., Muskel (histologisch). Eulenburgs Real-Encyklopädie der gesamten Heilkunde, Wien, 3. Aufl.
Rossi, A., Sul modo di terminare dei nervi nei muscoli dell' organo sonoro della cicada commune. Memorie della Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna, Serie 4, Vol. 1, 1880, p. 661.
Rouget, Ch., Note sur la terminaison des nerfs moteurs chez les Crustacés et les Insectes. Compt. rend., T. 59, 1864, p. 851.
Schultze, Max, Unters. über den Bau d. Nasenschleimhaut etc. Abhandl. d. Naturf. Ges. in Halle, Bd. 7, 1862.
— Allgemeines über die Strukturelemente des Nervensystems. In Handbuch der Lehre von den Geweben, herausgegeben von Stricker, Leipzig 1871.
Siebold, C. Th. v., Bericht über die Leistungen im Gebiete der Anatomie und Physiologie der wirbellosen Tiere in dem Jahre 1842. Müllers Arch., 1843, No. I, p. I.
Sihler, Chr., Neue Unters. über die Nerven der Muskeln mit besonderer Berücksichtigung umstrittener Fragen. Zeitschr. f. wissensch. Zool., Bd. 68, 1900, 323.
Thanhoffer, Jelentés 1876—ban külföldön tett utazásomról. Kiadta a földmiv, ipar és keresked. ministerium 1876.
Thanhoffer, L. v., Beiträge zur Histologie und Nervenendigung der quergestreiften Muskelfasern. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 21, 1882, p. 26.
Verworn, M., Allgemeine Physiologie, 4 Aufl., 1903, p. 403.
Viallanes[1]), H., Sur les terminaisons nerv. motrices dans les muscles striés d'Insectes. Av. 3 pl. Paris 1881.
Will, Fr., Vorl. Mitt. über die Struktur der Ganglien und den Ursprung der Nerven bei Wirbellosen. Müllers Arch., 1844, p. 76.
Wolff, M., Ueber die Ehrlichsche Methylenblaufärbung und über Lage und Bau einiger peripherer Nervenendigungen. Arch. f. Anat. u. Physiol., 1902, Anat. Abt., p. 155.